

Tract 565 ①

МАТЕРІАЛЫ

КЪ ДІЭТЕТИКЪ

ОСТРЫХЪ ВКУСОВЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

as Mustard — Pepper &c.

Вліяніе горчицы и перца на усвоеніе и обмѣнъ азотистыхъ
частей пищи и вліяніе горчицы на усвоеніе жира.

Диссертація

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

лекаря Павла Буржинскаго.


Ординатора прапедвѣтической терапевтической клиники профессора
В. А. Манассеина.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Департамента Удѣловъ, Моховая, № 36.

. 1887.



МАТЕРІАЛЫ

КЪ ДІАТЕТИКЪ


ОСТРЫХЪ ВКУСОВЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

Вліяніе горчицы и перца на усвоеніе и обмѣнъ азотистыхъ частей пищи и вліяніе горчицы на усвоеніе жира.

Диссертація
НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
лекаря Павла Буржинскаго.

Ординатора прапедвѣтической терапевтической клиники профессора
В. А. Манассеина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Департамента Удѣловъ, Моховая, № 36.
1887.



Докторскую диссертацию лекаря **Буржинскаго** подъ заглавіемъ: «Матеріалы къ діететики острыхъ вкусовыхъ веществъ. Вліяніе горчицы и перца на усвоеніе и обмѣнъ азотистыхъ частей пищи и горчицы на усвоеніе жира» печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи оной было представлено въ Конференцію Императорской Военно-Медицинской академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ, Апрѣля 25 дня 1887 г.

Ученый Секретарь **В. Пашутинъ**.

I.

Не смотря на то, что острыя вкусовые вещества составляют предмет повсемѣстнаго и ежедневнаго употребленія, на нихъ до сихъ поръ не было обращено надлежащаго вниманія.

Составляютъ ли они только прихоть вкуса, дѣлая пищу разнообразнѣе, или они, принятыя съ пищевыми веществами вліяютъ на самые пищеварительные органы, возбуждая или угнетая ихъ дѣятельность и, такимъ образомъ, вмѣшиваются въ усвоеніе питательныхъ веществъ. Въ обоихъ случаяхъ роль вкусовыхъ веществъ дѣлается уже очевидною, и достойною вниманія и всесторонняго изученія, потому что, зная ихъ свойства, мы получили бы право разумно примѣнять ихъ не только въ важномъ вопросѣ питанія здороваго, но и въ питаніи и лѣченіи больного.

Voit ¹⁾ называетъ пряными или вкусовыми веществами такія, которыя, будучи приняты въ весьма незначительномъ количествѣ, дѣлаютъ пищевыя средства вкусными и съѣдобными, но которыя не имѣютъ никакого значенія, какъ пищевыя вещества. Они не оказываютъ никакого непосредственнаго вліянія на разложеніе веществъ въ организмъ и ничего не имѣютъ общаго съ сохраненіемъ

¹⁾ Руководство къ физиологіи Германа. т. VI, ч. I, стр. 528, 1885 г. Переводъ проф. Щербакова.

матеріального состава тѣла. Зато они выполняютъ совершенно другую, но не мѣнѣе важную задачу при питаніи, чѣмъ пищевыя средства и для составленія пищи также необходимы, какъ и послѣднія.

Подъ именемъ вкусовыхъ средствъ Voit ¹⁾ принимаетъ не только тѣ, которыя исключительно сюда причисляются другими: кофе, чай, спиртные напитки и т. д., но также, и при томъ преимущественно, всѣ тѣ вещества, которыя сообщаютъ различнаго рода пищу свойственный ей и пріятный для насъ вкусъ и запахъ.

Часть употребляемой съ пищею поваренной соли Voit относитъ также къ вкусовымъ веществамъ, не смотря на то, что она играетъ роль пищевого вещества. Наконецъ, къ исключительно вкусовымъ веществамъ или пряностямъ Voit относитъ также и вещества, содержащія эфирныя масла или имѣющія острый вкусъ, какъ напримѣръ перецъ, горчицу, корицу, ваниль и т. п.

Проф. König ²⁾ и Пэви ³⁾ тоже не даютъ точнаго опредѣленія пряностямъ или вкусовымъ веществамъ. Они характеризуютъ ихъ просто какъ вещества, способствующія пищеваренію

Кромѣ того, Пэви дѣлитъ пряности по впечатлѣнію, которое они производятъ на вкусовые органы, относя въ одну группу ѣдкія: горчица, перецъ, въ другую ароматичныя: корица, мускатный орѣхъ; въ третью—такія, которыя дѣйствуютъ своей кислотой: уксусъ, лимонный сокъ и т. д.

У фармакологовъ тоже не существуетъ какого либо опредѣленнаго раздѣленія вкусовыхъ веществъ, но во всякомъ случаѣ они (Köhler, Nothnagel, Rossbach, Buchheim,

¹⁾ I. c.

²⁾ Проф. I. König. Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs und. Genussmittel. 1882 г.

³⁾ Пэви. Ученіе о пищѣ въ фізіологическомъ и терапевтическомъ отношеніяхъ. Перев. М. М. Манассеиной. 1876.

Vinz) отдѣляютъ вкусовыя вещества отъ такъ называемыхъ горькихъ.

Я не буду болѣе останавливаться надъ попытками характеризовать и классифицировать вкусовыя вещества. Очевидно, при современномъ состояніи нашихъ знаній о вкусовыхъ веществахъ трудно или почти невозможно сдѣлать имъ болѣе точное распредѣленіе, основываясь на вліяніи ихъ на тѣ или другіе органы или процессы, исключая конечно тѣхъ, которыя болѣе или менѣе изучены—спиртные и ароматическія напитки, мясныя вытяжки.

Цѣль настоящей работы составляетъ попытку, хотя немного, освѣтить вліяніе острыхъ вкусовыхъ веществъ на усвоеніе азотистыхъ частей смѣшанной пищи и жира молока.

Для рѣшенія этого вопроса изъ массы острыхъ вкусовыхъ веществъ я выбралъ одни изъ самыхъ распространенныхъ, именно горчицу и перецъ.

Я назвалъ ихъ острыми только по тому ощущенію, которое они вызываютъ во вкусовыхъ органахъ.

Горчица и перецъ имѣли широкое примѣненіе не только какъ вкусовыя, но и какъ внутреннія лекарственныя вещества еще у Грековъ. Такъ, уже Гиппократъ ¹⁾ наблюдалъ за дѣйствіемъ горчицы; онъ говоритъ, что горчица есть вещь горячительная и слабительная и вызываетъ боль при мочеиспусканіи. Особенно широко примѣняли горчицу и перецъ, какъ лекарственныя вещества, Галенъ. Достаточно сказать, что по указателю къ сочиненіямъ Галена Antonii Musae Brassavoli ²⁾ Галенъ говоритъ о горчицѣ въ 55, а о перцѣ въ 91 мѣстѣ своихъ сочиненій.

Я приведу только нѣкоторыя указанія Галена къ внутреннему употребленію перца и горчицы. Такъ, напри-

¹⁾ Περὶ διαίτης II. pg. 359. Ed. An. Thesii 1657. T I.

²⁾ Ant. Musae Brassavoli index refertissimus in omnes Galeni libros. Venetiis. MDLVI.

мѣрь, онъ ¹⁾ совѣтуетъ, какъ лѣкарственное вещество, употребленіе смѣси изъ трехъ сортовъ перца, извѣстной подъ названіемъ *διὰ τριῶν πικερῶν*.

При страданіяхъ кишекъ онъ также употребляетъ перецъ ²⁾; при хроническомъ катаррѣ желудка Галенъ рекомендуетъ перецъ и именно бѣлый, растертый въ водѣ. Запоры ³⁾, болѣзни печени, вялость пищева- ренія (*tarditas concoctionis*) ⁴⁾ все это онъ лечитъ перцемъ.

Кромѣ того, Галенъ даетъ перецъ и горчицу не только при страданіяхъ желудочно-кишечнаго канала, но и при *febris quartana* ⁵⁾, при кашлѣ и кровохарканіи ⁶⁾. Далѣе, Галенъ рассматриваетъ горчицу и перецъ и какъ вкусовые вещества. Такъ, онъ говоритъ, что они способствуютъ перевариванію другихъ пищевыхъ средствъ ⁷⁾.

Celsus ⁸⁾ даетъ чеснокъ или воду съ перцемъ передъ приступами перемежающейся лихорадки.

Діоскоридъ ⁹⁾ въ своей *materia medica* собралъ цѣлую массу свѣдѣній о вліяніи горчицы и перца на организмъ. Такъ, перецъ по названному автору усиливаетъ отдѣленіе мочи и способствуетъ пищева- ренію. Перецъ, какъ при введеніи внутрь, такъ и употребляемый въ видѣ мазей предупреждаетъ знобы при перемежающейся лихорадкѣ, вызываетъ выкидыши (*partus extrahit*) и препятствуетъ беременности, если вводится въ видѣ суппозиторія послѣ coitus'a. Въ видѣ питья и кашики помогаетъ при грудныхъ болѣзняхъ, прекращаетъ кишечныя колики, прек-

¹⁾ De Sanitate tuenda. Libr. V. Cap. 6, Ed. Kühn. t. VI. стр. 340.

²⁾ De sanit. tuenda. L. VI. Cap. 10, стр. 430.

³⁾ L. c. libr. VI, Cap. X.

⁴⁾ L. c. libr. VI, Cap. VII.

⁵⁾ De arte curandi. Libr. I, Cap. II.

⁶⁾ De compositione medicamentorum. L. VII, Cap. II.

⁷⁾ De alimen. facultatibus. L. III. Cap. 23.

⁸⁾ A. Cornelii Celsi. De medicina L. III. Cap. 12. Ed. Almelowen. 1746 г. Стр. 142.

⁹⁾ Dioscorides. Libr. II. Matthioli opera.

ращаетъ боли и усиливаетъ аппетитъ; прибавленный къ пищѣ помогаетъ пищеваренію и вообще сохраняетъ здоровье.

Внутреннее употребленіе горчицы имѣло у Діоскорида ¹⁾ меньше значеніе. Онъ хвалитъ ее только при эпилепсіи и при перемежающихся лихорадкахъ.

Аретей ²⁾ даетъ горчицу при угнетеніи нервной системы въ лихорадочныхъ формахъ (*letargus*).

Орибазій ³⁾ думаетъ, что горчица и перецъ способствуютъ появленію мѣсячныхъ (*menses ducunt*).

Горчица по Плинію ⁴⁾ нейтрализуетъ ядовитыя начала грибовъ.

Однако и между древними врачами были противники употребленія горчицы, какъ вкусоваго вещества.

Павель Эгипскій ⁵⁾ находитъ, что горчица обладаетъ острыми свойствами и вредна для желудка.

А Аретей говоритъ, что послѣ употребленія горчицы могутъ наступить рвота и поносъ ⁶⁾.

Я ограничусь приведенными выписками изъ древнихъ авторовъ, такъ какъ онѣ не имѣютъ прямого отношенія къ моей работѣ; тѣмъ не менѣе, мнѣ хотѣлось бы обратить вниманіе на то обстоятельство, что большинство приведенныхъ авторовъ смотритъ на горчицу и перецъ какъ на вещества, улучшающія пищевареніе и вообще какъ на вещества цѣлебныя.

Переходя затѣмъ къ позднѣйшимъ авторамъ, мы и у нихъ находимъ тотъ же самый взглядъ на вліяніе горчицы и перца на пищевареніе. Къ сожалѣнію, выводы большинства ихъ страдаютъ отсутствіемъ прямого опыта.

¹⁾ Dioscorides Libr. II, Cap. 148, Matthioli opera. Стр. 424.

²⁾ Aretaeus. De curatione acutorum. Libr. I. Cap. II.

³⁾ Oribasii collect. libr. XIV, Cap. 65.

⁴⁾ Plinius. libr. XX. Cap. LXXXVII.

⁵⁾ P. Aegineta. De re medica. l. I, Cap. 74. H. Stephanus. Medicarum artes principes.

⁶⁾ Aretaeus. De curatione acutorum. l. I. Cap. II.

Въ диссертациі G. Pfeffer'a ¹⁾ собрана древняя и средне-вѣковая литература о перцѣ; собственныхъ же наблюденій авторъ не даетъ.

Горчица по Richter'у ²⁾ ускоряетъ пищевареніе, усиливаетъ его и дѣлаетъ болѣе правильнымъ; возбуждаетъ аппетитъ, слегка увеличиваетъ отдѣленіе слизистыхъ оболочекъ первыхъ путей и способствуетъ испражненію. Въ болѣе значительныхъ дозахъ можетъ вызвать рвоту, поносъ и воспаленіе желудочнаго кишечнаго канала.

Такого же мнѣнія Richter и о вліяніи перца на пищевареніе. Онъ совѣтуетъ перецъ при запорахъ, для усиленія дѣятельности желудка, противъ перемежающейся лихорадки, для возбужденія *menstrua*.

По Wibmer'у ³⁾ горчица способствуетъ испражненіямъ, но введенная въ большихъ количествахъ вызываетъ рвоту, поносъ и даже воспаленіе желудка.

Прежде, чѣмъ приводить тѣ немногія литературныя данныя, которыя касаются вліянія отдѣльныхъ составныхъ частей горчицы и перца на организмъ, я приведу нѣсколько указаній на количество ихъ въ вышеназванныхъ веществахъ и на нѣкоторыя ихъ свойства.

Я избѣгаю подробнаго фармацевтическаго описанія ихъ, такъ какъ это заставило бы меня выйти изъ предѣловъ моей работы и не внесло бы ничего новаго для освѣщенія добытыхъ матеріаловъ.

Semen siparis nigri, употребляющаяся какъ вкусовое вещество и которую я употреблялъ въ своихъ опытахъ, состоитъ по H. Nassal'ю ⁴⁾ изъ слѣдующихъ частей:

¹⁾ G. Pfeffer. De pipere. Diss. Helmestadii. 1740.

²⁾ August Richter. Ausführliche Arznei-mittellehre. 1827.

³⁾ Karl Wibmer. Die Wirkung der Arznei-mittel und Gifte.

⁴⁾ Цитирую по König'у. Die menschlichen Nahrungs und Genussmittel. 1883. Стр. 464.

С ѣ м е н а:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Воды | 5,92 ⁰ / ₀ |
| Мирозину и бѣлку | 26,28 ⁰ / ₀ |
| Мирозиновой кислоты . . . | 4,78 ⁰ / ₀ |
| Летучаго масла | 1,27 ⁰ / ₀ |
| Жиру | 32,55 ⁰ / ₀ |
| Азота | 5,13 ⁰ / ₀ |
| Сѣры | 1,32 ⁰ / ₀ |
| Клѣтчатки | 16,38 ⁰ / ₀ |
| Золы | 4,28 ⁰ / ₀ |

Я не привожу количествъ составныхъ частей горчицы, приготовленной къ употребленію (которыя приведены у König'a), потому что онѣ будутъ рѣзко колебаться въ зависимости отъ способовъ приготовленія.

Дѣйствующее острое начало въ горчицѣ, какъ наводящее красноту на кожѣ, такъ и придающее горчицѣ свойственный ей запахъ и вкусъ, есть эфирное масло.

По Flückiger'у ¹⁾ посредствомъ перегонки горчицы получается въ среднемъ отъ 0,44⁰/₀—0,57⁰/₀ эфирнаго масла формулы $C_4 H_5 NS$. Оно представляетъ собою сѣрноціанистый или роданистый аллилъ, уд. в. 1,010; точка кипѣнія при 148° С.; оптически недѣятельно.

Это масло не обнаруживается въ цѣлыхъ сѣменахъ, а появляется вскорѣ послѣ соединенія порошка сѣмянъ съ водою температуры 50—60° С.

По Will'ю и Körner'у (привожу изъ Flückiger'a) горчица содержитъ небольшое количество безводной кристаллической калийной соли мироновой кислоты состава $C_{10} H_{18} LKS_2 O_{10}$. Вліяніе воды на этотъ мироновокислый калий состоитъ въ томъ, что онъ въ присутствіи мирозина ²⁾ распадается на:

¹⁾ Lehrbuch der Pharmacognosie des Pflanzenreiches 1867. стр. 689.

²⁾ Выдѣленный мироновокислый кали можетъ быть разложенъ также посредствомъ щелочей, а по Ludwig'у и Lang'у солями серебра.

| | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Сахаръ. | $C_6 H_{12} O_6$ | } $C_{10} H_{18} NKS_2 O_{10}$ |
| Кислое сѣрнокислое кали . | $KHS O_4$ | |
| И эфирное масло. | $C_4 H_5 SN$ | |

Мпрозинъ, открытый въ 1839 г. Bussy (по Flückiger'у) представляетъ бѣловое тѣло, составныя части котораго еще не установлены.

При дѣйстви мпрозина на мпроновокислый кали онъ самъ при этомъ измѣняется; никакое другое тѣло не дѣйствуетъ подобнымъ образомъ на горчицу. Водный растворъ мпрозина свертывается при $60^{\circ} C$. и теряетъ свое дѣйствіе, почему порошокъ горчицы, обработанный кипящей водою, не даетъ эфирнаго масла.

Количество мпрозина въ горчицѣ точно не опредѣлено, но должно быть, по мнѣнію Flückiger'a, незначительно, потому что въ цѣломъ сѣмени Hoffmann нашелъ всего 2,9% азота, что соотвѣтствовало бы 18% мпрозина, конечно въ томъ случаѣ, если бы послѣдній имѣлъ столько же азота, какъ и альбуминъ и если бы все количество азота можно было бы отнести на мпрозинъ.

При раздавливаніи зеренъ горчицы получается до 32% жирнаго масла, состоящаго изъ связанныхъ съ глицериномъ стеариновой, олеиновой и эруковой или брассиновой кислотъ. Эта послѣдняя находится въ жирномъ маслѣ бѣлой горчицы (*Sinapis alba*).

Золы по Flückiger'у въ горчицѣ 4% и состоитъ она изъ фосфорно-кислой извести, магнезіи и калия.

Въ заключеніе не могу не упомянуть о свойствѣ горчичнаго - эфирнаго масла, найденномъ Eberbach'омъ ¹⁾, именно—оно уничтожаетъ способность бѣлка и молока свертываться при кипяченіи и прекращаетъ алкогольное броженіе.

¹⁾ Husemann. Die Pflanzenstoffe in chemischer, physiologischer, pharmacolog. und toxikolog. Hinsicht. 1882. Стр. 806.

Что касается перца, то употреблявшійся мною былъ — *piper nigrum*.

Черный перецъ представляетъ собою незрѣлыя высушенныя ягоды, между тѣмъ какъ бѣлый перецъ — зрѣлый плодъ.


По König'у ¹⁾ въ черномъ перцѣ:

| | |
|---------------------------|--------|
| Воды | 17,01% |
| Азотистыхъ веществъ . . | 11,99% |
| Эфирнаго масла . . . | 1,12% |
| Жиру | 8,82% |
| Клѣтчатки | 14,49% |
| Безъазотистыхъ веществъ . | 42,02% |
| Золы | 4,57% |

Жгучій вкусъ перца Flückiger ²⁾ приписываетъ небольшому количеству содержащейся въ немъ смолы, а запахъ эфирному маслу изомерному терпентину.

Въ 1819 году Oerstedt ³⁾ открылъ въ перцѣ алколоидообразное тѣло — пиперинъ. Въ чистомъ видѣ онъ представляетъ безцвѣтныя моноклиническія призмы безъ всякаго вкуса. Въ водѣ мало растворимъ даже при кипяченіи, между тѣмъ какъ въ винномъ спиртѣ растворяется 1—30 въ холодномъ и 1—1 въ горячемъ, (кромѣ того онъ растворимъ въ эфирѣ, бензинѣ, хлороформѣ и креозотѣ).

Пиперинъ (по Husemann'у) — весьма слабое основаніе. Разведенныя минеральныя кислоты едва замѣтно растворяютъ его и не соединяются съ нимъ. Формула его по Strecker'у ⁴⁾



¹⁾ l. c. стр. 460.

²⁾ l. c. стр. 616.

³⁾ По Husemann'у. Стр. 487.

⁴⁾ Husemann. Стр. 488.

При нагреваніи пиперина съ спиртнымъ растворомъ ѣдкаго кали, съ натроиною или калиною известью получается пиперидинъ — $C_5H_{11}N$ и пипериновая кислота.

Кромѣ того, Бухгеймъ ¹⁾ нашелъ въ перцѣ хавицинъ, который представляетъ собою желтовато-бурую массу, консистенціи густаго терпентина, въ высшей степени остраго перечнаго вкуса.

По Бухгейму отношеніе хавицина къ пиперину слѣдующее: въ то время какъ пиперинъ представляетъ собою пиперидинъ $N \left\{ \begin{array}{l} C_5H_{10} \\ H \end{array} \right.$, въ которомъ одинъ водородъ замѣщенъ пипериновой кислотой $N \left\{ \begin{array}{l} C_5H_{10} \\ C_{12}H_9O_3 \end{array} \right.$, хавицинъ представляетъ тотъ же пиперидинъ, но съ замѣщеніемъ водорода хавициновой кислотой.

Первый изслѣдовавшій эфирное горчичное масло опытнымъ путемъ на животныхъ (кроликахъ) былъ Mitscherlich ²⁾. Хотя опыты его имѣютъ главнымъ образомъ токсикологическій характеръ, тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, результаты ихъ могутъ имѣть значеніе при оцѣнкѣ вліянія горчицы на организмъ даже и въ обыкновенныхъ дозахъ.

На основаніи своихъ опытовъ онъ приходитъ къ тому убѣжденію, что эфирное горчичное масло, наиболѣе ядовитое изъ эфирныхъ маселъ, при введеніи въ желудокъ въ количествѣ одной драхмы убиваетъ кролика въ теченіе $\frac{1}{2}$ часа, а въ количествѣ $\frac{3}{4}$ —въ 15 минутъ. У отравленныхъ животныхъ въ выдыхаемомъ воздухѣ и въ крови ощущается явственный запахъ этого эфирнаго масла. Достойно вниманія то обстоятельство, что не смотря на токсическія дозы, желудокъ и кишечный каналъ кроликовъ представляли, по мнѣнію Mitscherlich'a, только картину сла-

¹⁾ Archiv für experimen. Pathol. und Pharmac. B. V, 1876, Стр. 455.

²⁾ Mitscherlich. Lehrbuch der Arzneimittellehre. 1849.

баго воспаленія, хотя онъ наблюдалъ сильную гиперемію сосудовъ и слущиваніе эпителія. Митчерлихъ говоритъ о слабомъ воспаленіи желудочно-кишечнаго тракта вслѣдствіе того, можетъ быть, что животныя погибали раньше, чѣмъ полная картина воспаленія могла развиться.

Въ почкахъ въ одномъ случаѣ оказалось незначительная гиперемія. Кровь имѣла темный цвѣтъ и медленно свертывалась. Сердце и мышцы сохраняли свою раздражительность долго послѣ смерти.

Картина отравленія такая: вскорѣ послѣ введенія масла сердечное бѣіеніе значительно учащалось, быстро уменьшалась чувствительность, затѣмъ появились затрудненное, замедленное дыханіе, судороги, охлажденіе конечностей и смерть.

Въ 1879 году Нензе ¹⁾ въ лабораторіи Köhle'га произвелъ рядъ наблюденій надъ дѣйствіемъ эфирнаго горчичнаго масла на собакъ, кроликовъ и хомяковъ.

При впрыскиваніи въ кровь $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{5}$ 0/0 эмульсіи изъ масла онъ находилъ немедленное повышеніе кровянаго давленія, причемъ оно не возвращалось къ прежней высотѣ, а продолжало повышаться при каждомъ новомъ впрыскиваніи.

При повторныхъ впрыскиваніяхъ малыхъ количествъ масла оно накапливается въ крови, такъ что наступаетъ дѣйствіе большихъ дозъ.

Поднятіе кровянаго давленія, сопровождающееся замедленіемъ пульса, приписывается авторомъ раздражанію вазомоторнаго центра въ продолговатомъ мозгу, такъ что паденіе кровянаго давленія зависитъ отъ паралича этого центра.

Дыханіе при впрыскиваніи въ вену значительно ускоряется и дѣлается поверхностнымъ, смѣняясь скоропрохо-

¹⁾ Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. 1878. № 24. Versuche über das ätherische Senföl.

дящими паузами. Подъ конецъ оно становится неправильнымъ, медленнымъ и затрудненнымъ.

При вдыханіи 10 капель чистаго эфирнаго горчичнаго масла у кроликовъ и хомяковъ дыханіе сначала учащается, затѣмъ замедляется, дѣлается диспноичнымъ и судорожнымъ.

При вскрытіи отравленныхъ такимъ образомъ животныхъ находили иногда пневмоніи и отекъ легкихъ.

Рефлекторная возбудимость отъ очень постепенныхъ инъекцій малыхъ дозъ сначала повышается, получается картина весьма похожая на возбужденіе при стрихнинномъ отравленіи; затѣмъ, рефлексy понижаются и окончательно исчезаютъ, причемъ дыханіе можетъ еще продолжаться. $\frac{1}{2}$ —1% эмульсія масла, вводимая кролику въ желудокъ въ продолженіи нѣсколькихъ дней, вызвала въ желудкѣ и соесисъ разлитую красноту и обширныя экстравазаты. Въ печени животныхъ наблюдались микроскопическія кровоизліянія (геморрагіи), но жироваго перерожденія замѣчено не было. Наконецъ, продолжительно вводимыя въ желудокъ малыя дозы масла вызывали общій желудочно-кишечный катарръ.

Температура тѣла послѣ введенія горчичнаго масла какимъ бы то ни было путемъ очень быстро и рѣзко понижалась.

Возбужденіе перистальтики ни разу не наблюдалось.

Къ сожалѣнію, вышеназванныя наблюдатели не обращали вниманія на вліяніе горчичнаго масла на дѣятельность пищеварительныхъ органовъ.

Этотъ важный пробѣлъ въ интересующемъ меня вопросѣ былъ восполненъ недавно докторомъ Чельцовымъ; результаты его опытовъ я приведу ниже.

Что же касается вопроса о вліяніи составныхъ частей перца на животный организмъ вообще и на человѣка въ

особенности, то въ этомъ отношеніи литература также бѣдна, какъ и литература горчицы.

Надъ свойствами нѣкоторыхъ составныхъ частей чернаго перца работали опытнымъ путемъ на животныхъ и на человѣкѣ Neumann ¹⁾ Mosler и Sönderup ²⁾ и другіе.

Neumann ³⁾ послѣ приѣма 2,50 грм. чистаго пиперина испытывалъ различныя ощущенія въ периферической нервной системѣ. Вліяніе же его на сердечную дѣятельность онъ не могъ замѣтить.

Затѣмъ Soenderop ⁴⁾ по предложенію проф. Mosler'a изслѣдовалъ вліяніе пиперина на селезенку.

Опыты производились на собакахъ.

Селезенка предварительно обнажалась, измѣрялась ея величина, затѣмъ снова вшивалась въ брюшную полость. Послѣ этого вводился порошокъ въ желудокъ въ видѣ эмульсіи.

Въ одномъ случаѣ дано было небольшой собакѣ 1,75 грм. пиперина. Черезъ 2 часа селезенка явственно уменьшилась, а поверхность ея сдѣлалась бугристою и морщинистою.

Въ другомъ случаѣ введено было 2,0 грм. пиперина въ эмульсіи. Черезъ 4 часа селезенка снова оказалась значительно уменьшенною въ объемѣ, поверхность ея сдѣлалась плотною, зернистою и мѣстами втянутою. Температура въ этомъ случаѣ послѣ введенія пиперина упала съ 38,6 до 37,2°.

Кромѣ того, Soenderop сдѣлалъ длинный рядъ наблюденій надъ вліяніемъ пиперина на температуру тѣла у людей.

¹⁾ Neumann. Ueber den vorzugsweise Wirksamen Bestandtheile des Schwarzen Pfeffers. Diss. Dorpat. 1860.

²⁾ Mosler и Sönderup. Berliner klinische Wochenschrift, 1876. № 49.

³⁾ Цитирую по Бухрейму, Arch. f. exper. pathol. und pharmacologie. 1876. B. V, стр. 455.

⁴⁾ Berlin. klin. Wochenschrift. 1876. № 52.

На основаніи этихъ опытовъ Mosler ¹⁾ утверждаетъ, что нельзя отрицать вліянія пиперина на паденіе температуры. Но maximum паденія, который припилось наблюдать, былъ 0,4°. Soenderop самъ принималъ пиперинъ. Дозы до 1,0 грм. переносились имъ безъ затрудненія. Кромѣ небольшого чувства жженія (въ желудкѣ?) появлявшагося вскорѣ послѣ принятія и недолго продолжавшагося, онъ ничего не замѣтилъ. Но отъ дозъ въ 1,5—2,0 грм. разстраивалось пищевареніе: появлялся перечный вкусъ во рту, отсутствіе аппетита и колики.

Относительно вліянія пиперина на перемежающуюся лихорадку я отсылаю интересующихся этимъ къ Huseman'у ²⁾ и къ Trouseau и Pidoux ³⁾, у которыхъ приведена литература этого вопроса.

Что касается пиперидина, то надъ дѣйствіемъ его на животный организмъ работали Kronecker и Fliess ⁴⁾. Къ сожалѣнію, мнѣ не удалось найти ихъ подлинныхъ работъ, а потому ограничиваюсь выпискою изъ реферата о нихъ Fliess'a въ Берлинскомъ фізіологическомъ обществѣ 27-го Января 1882 года.

Kronecker нашелъ замѣчательный параллелизмъ въ токсическомъ и химическомъ дѣйствіи пиперидина и коніина. Оба они нервныя яды, но пиперидинъ парализуетъ чувствительныя, а коніинъ двигательныя нервныя волокна.

Fliess испытывалъ пиперидинъ на лягушкахъ и теплокровныхъ—у тѣхъ и другихъ онъ нашелъ пониженіе рефлексовъ.

Вліяніе горчицы собственно на пищеварительную дѣятельность желудка у человѣка до сихъ поръ совершенно не было изслѣдовано, если не считать одного опыта

¹⁾ Berlin. klinische Wochenschr. 1876. № 52.

²⁾ l. c. стр. 491.

³⁾ Traité de thérapeutique et de matière médicale, Paris. 1877.

⁴⁾ Arch. f. Physiologie. Du Bois-Reymond, 1882.

Beaumont'a ¹⁾ надъ охотникомъ A. de St. Martin въ 1825 году. Опытъ этотъ состоялъ въ томъ, что черезъ желудочную фистулу онъ ввелъ въ одномъ случаѣ мясо съ солью, а въ другомъ мясо съ горчицей.

Въ первомъ случаѣ изслѣдуемая порція переварилась въ 3 час. 36 мин., а во 2-мъ въ 3 час. 10 минутъ.

Къ сожалѣнію, изъ этого опыта трудно сдѣлать какой нибудь выводъ, въ виду того, что не извѣстно, одинаковое-ли количество мяса вводилось въ томъ и другомъ случаѣ.

Кромѣ того, и самый способъ, который онъ употреблялъ для опредѣленія конца перевариванія не даетъ права на какое-либо заключеніе.

Теперь я перехожу къ работѣ доктора Чельцова ²⁾ (изъ клиники проф. С. П. Боткина)—единственной опытной работѣ, которая близко касается интересующаго меня предмета.

Цѣль этой работы была показать вліяніе острыхъ веществъ (чеснока, лука, перца, горчицы) на отдѣленіе желудочнаго сока, на желудочное пищевареніе и на отдѣленіе желчи у животныхъ (собакъ). Опыты съ отдѣленіемъ желудочнаго сока были сдѣланы на собакъ съ постоянной желудочной фистулой.

„Обстановка опытовъ была слѣдующая: послѣдній разъ передъ опытомъ собаку кормили наканунѣ (за 18—20 часовъ); въ самый день опыта поступали двоякимъ способомъ: или животному черезъ фистулу вливали въ желудокъ 10 куб. сант. воды, или же давали опредѣленное количество мяса. Далѣе, въ томъ и другомъ случаѣ поступали одинаковымъ образомъ: давали собакъ свободно бѣгать въ продолженіи 15—20 минутъ и только приступали къ

¹⁾ Neue Versuche und Beobachtungen über den Magensaft und die Physiologie der Verdauung. Uebersetzt v. Dr. Luden. 1834.

²⁾ Ежедневная Клиническая газета. 1886. №№ 16, 17, 18.

собиранію сока тогда, отбрасывая первыя порціи. Прособиравъ сокъ 1 ч. или $1\frac{1}{2}$ ч. мы вводили тѣмъ же путемъ въ желудокъ испытуемое вещество (количество воды и здѣсь бралось такое же, какъ и передъ началомъ собиранія), а затѣмъ поступали какъ и въ первую половину опыта“.

Изъ таблицы, приведенной докторомъ Чельцовымъ, видно, что въ первомъ опытѣ изъ желудочной фистулы собаки послѣ введенія 10 куб. сант. воды, въ продолженіе первыхъ 35 минутъ вытекло желудочнаго сока 1,2 куб. сант. между тѣмъ какъ при тѣхъ же условіяхъ, но послѣ введенія тѣхъ же 10 к. с. воды съ 0,25 грм. перца въ порошокъ, въ продолженіе тоже первыхъ 35 минутъ вытекло сока 15,3 к. с.

Увеличенное выдѣленіе желудочнаго сока продолжалось во все время наблюденія (1 ч. 15 мин.).

Во 2 и 3 опытѣ, гдѣ было введено 0,2 и 0,5 порошка перца, получились такіе же результаты, хотя увеличеніе отдѣленія желудочнаго сока въ третьемъ опытѣ—не столь рѣзкое, какъ въ двухъ первыхъ.

Въ четвертомъ и пятомъ опытахъ при той же обстановкѣ, какъ и въ первыхъ трехъ, собакѣ вводился порошокъ горчицы въ количествѣ 0,2 грм. въ обоихъ случаяхъ. Результатомъ того и другаго опыта получилось увеличеніе выдѣленія желудочнаго сока послѣ введенія порошка горчицы. Но увеличеніе это было значительно менѣе, нежели послѣ введенія перца.

Такъ, въ 4 опытѣ до введенія горчицы въ продолженіе 55 минутъ вытекло 4,6 куб. сант., а послѣ введенія ея выдѣлилось черезъ фистулу въ продолженіе того-же времени 10,2 к. с. желудочнаго сока.

Не смотря на весь интересъ приведенныхъ опытовъ, нельзя не пожалѣть о томъ, что авторъ не опредѣлялъ качества желудочнаго сока, вытекавшаго послѣ введенія

вышеназванныхъ веществъ, хотя бы посредствомъ опредѣленія степени кислотности его.

Въ другой серіи опытовъ авторъ занимался желудочнымъ пищевареніемъ. Опыты эти обставлены были слѣдующимъ образомъ:

Во-первыхъ, дѣлались опыты съ искусственнымъ пищевареніемъ въ пробиркахъ, при чемъ въ три пробирки наливался поровну полученный чрезъ фистулу (на желудкѣ собаки) отстоянный желудочный сокъ, одна пробирка оставлялась для контроля, а къ остальнымъ прибавлялось то или другое количество испытуемаго вещества. Для перевариванія употреблялся крутой бѣлокъ. Продолжительность опыта равнялась 20—24 часамъ при температурѣ 38—40° С. Послѣ перевариванія остатки неперевареннаго бѣлка обмывались, сушились при 98—99° С и взвѣшивались.

Опыты второго рода заключались въ томъ, что изъ трехъ равныхъ количествъ бѣлка двѣ порціи одна за другой вводились въ желудокъ собаки въ тюлевыхъ мѣшечкахъ, при чемъ вмѣстѣ со второй порціей вводилось испытуемое вещество, и всѣ три высушивались.

Изъ многихъ опытовъ авторъ приводитъ шесть съ горчицей и перцемъ. Въ первомъ опытѣ взято 3 порціи желудочнаго сока по 4 к. с., бѣлка по 1 грм., одна оставлена, какъ контрольная, а къ двумъ другимъ прибавлено 0,02 и 0,05 грм. порошка перца; продолжительность опыта 22 часа. Результатъ перевариванія (послѣ высушиванія остатковъ) оказался слѣдующій:

| Всѣй остатка въ контрольной порціи. | Всѣй порціи съ 0,02 грм. перца. | Всѣй порціи съ 0,05 грм. перца. | Всѣй остатка отъ 1,0 бѣлка. |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Опытъ 1-й 0,106 . | 0,099 | 0,100 | 0,149 |
| Опытъ 2-й 0,096, ¹⁾ | 0,099 | 0,092 | 0,128 |

¹⁾ Перевариваніе—26 часовъ.

Въ этихъ двухъ опытахъ перевариваніе сильнѣе шло въ пробиркахъ, гдѣ былъ добавленъ перецъ, причемъ доза перца, повидимому, не вліяла на силу перевариванія. Въ третьемъ опытѣ опытная порція бѣлка была введена въ желудокъ съ 0,25 грм. перца, разболтаннаго въ 10 к. с. воды. Черезъ 1 часъ она вѣсила на 0,004 грм. меньше контрольной. Прибавленіе же къ перевариваемымъ порціямъ въ пробиркахъ порошка горчицы дало обратные результаты, именно въ опытѣ четвертомъ, гдѣ для перевариванія взято было по 0,5 грм. бѣлка и въ опытную порцію прибавлено 0,01 грм. сухой горчицы, послѣ перевариванія опытный бѣлокъ вѣсилъ только на 0,001 грм. менѣе контрольнаго бѣлка. Между тѣмъ, въ 5 опытѣ порція бѣлка съ 0,01 грм. горчицы вѣсила послѣ опыта на 0,002 грм. болѣе контрольной, а другая порція его, гдѣ горчицы прибавлено было вдвое болѣе, вѣсила на 0,012 грм. болѣе контрольной.

Такимъ образомъ, на основаніи своихъ опытовъ авторъ дѣлаетъ заключеніе, что перецъ совершенно индифферентно относится къ желудочному пищеваренію, а горчица только въ малыхъ дозахъ не препятствуетъ перевариванію бѣлка, а въ большихъ—угнетаетъ его.

Однако, при оцѣнкѣ этихъ результатовъ, мнѣ кажется, необходимо принять во вниманіе противубродильныя свойства эфирнаго горчичнаго масла, хотя и доказанныя Непзе ¹⁾ только для алкогольнаго, гниlostнаго, молочно-кислаго и амміачнаго броженія. Это обстоятельство и только что приведенные опыты даютъ поводъ думать, что противубродильныя свойства горчичнаго масла распространяются и на желудочный сокъ. Принимая это во вниманіе, нельзя не признать, что перевариваніе въ пробиркѣ въ этомъ случаѣ будетъ особенно рѣзко отличаться отъ перевариванія въ желудкѣ, потому что въ послѣднемъ

¹⁾ 1. с.

раздражающій агентъ вызываетъ усиленное и продолжительное (опыты д-ра Чельцова) выдѣленіе желудочнаго сока, что уменьшаетъ процентное содержаніе этого противубродильнаго вещества въ желудкѣ. Кроме того, препятствующее пищеваренію горчичное масло можетъ быть уже удалено изъ желудка въ то время, когда усиленное выдѣленіе желудочнаго сока, имъ вызванное, еще продолжается. Дѣйствительно, въ опытѣ шестомъ, гдѣ со второй порціей бѣлка было введено въ желудокъ такое же количество горчицы, какъ и въ 5 опытѣ (0,02 грм.), уже черезъ 1½ часа она (порція), хотя и незначительно, но всетаки, уменьшилась въ вѣсѣ (на 0,001 грм.) сравнительно съ контрольной.

Опыты надъ вліяніемъ перца и горчицы на выдѣленіе желчи дѣлались авторомъ на собакѣ съ полной желчной фистулой.

Собака послѣдній разъ кормилась наканунѣ опыта. Въ желчную фистулу вводилась стеклянная трубочка. Желчь собиралась въ колбочки, спустя нѣкоторое время послѣ введенія трубки. Колбочки мѣнялись каждые ½ часа. „Испытуемое средство вводилось зондомъ лишь тогда, когда двѣ порціи желчи были приблизительно равны между собою“.

Въ опытѣ 7-мъ результаты слѣдующіе: при введеніи въ желудокъ 1,0 грм. перца въ 25 к. с. воды 0/0 твердаго остатка желчи увеличился въ первые ½ часа на 1,20 грм., сравнительно съ контрольнымъ, во вторые — на 0,83, въ третьи — уменьшился на 0,13, а въ четвертые — увеличился, сравнительно съ первымъ контрольнымъ ½ час. на 2,76 грм.

Въ 9 опытѣ при тѣхъ же условіяхъ было введено 0,5 грм. перца, причемъ 0/0 твердаго остатка желчи въ продолженіе 4-хъ получасовыхъ промежутковъ былъ меньше контрольнаго.

При введеніи въ желудокъ при тѣхъ же условіяхъ 0,5 грм. горчицы въ 25 к. с. воды (опытъ 8) найдено было увеличеніе $\%$ твердаго остатка, наоборотъ, введеніе вдвое большаго количества горчицы вызвало уменьшеніе $\%$ сухаго остатка (опытъ 10).

Такимъ образомъ, эти 4 опыта не дали какого-либо опредѣленнаго результата.

Приходя къ окончательному выводу, авторъ заключаетъ, что перецъ совершенно индифферентно относится къ желудочному пищеваренію. Горчица только въ малыхъ дозахъ не препятствуетъ перевариванію бѣлка желудочнымъ сокомъ, а въ большихъ — несомнѣнно угнетаетъ его.

Что касается до вліянія горчицы и перца на желчь, то, по мнѣнію автора, эти вещества увеличиваютъ отдѣленіе ея (если принять во вниманіе вѣсъ сырой желчи?).



Въ виду того, что непосредственныхъ опытовъ надъ вліяніемъ горчицы, перца и другихъ острыхъ вкусовыхъ веществъ на усвоеніе у человѣка не существуетъ, а то, что имѣется въ литературѣ, касается только животныхъ и имѣетъ главнымъ образомъ общепармакологическій и токсикологическій характеръ, — я и сдѣлалъ нѣсколько опытовъ надъ усвоеніемъ азота изъ смѣшанной пищи при горчицѣ и перцѣ и усвоеніемъ жира молока при горчицѣ у здоровыхъ людей.

Такая задача по отношенію къ вышеназваннымъ веществамъ мнѣ казалась особенно важной и интересной потому, что рѣшеніе ея подвело бы итогъ вліянію этихъ веществъ на отдѣльныя части пищеварительнаго тракта, тѣмъ не мѣнѣе я не отрицаю и того высокаго интереса, который представили бы опыты надъ вліяніемъ острыхъ вкусовыхъ веществъ на отдѣльные органы пищеварительнаго канала, но, къ сожалѣнію, это возможно пока на людяхъ

только по отношенію къ полостямъ рта и желудка. И вліяніе этихъ веществъ на количество и качество желудочнаго сока, а также на силу и продолжительность перевариванія составятъ предметъ отдѣльной работы.

При постановкѣ моихъ опытовъ я задался цѣлью изслѣдовать усвоеніе у людей привычныхъ и непривычныхъ къ употребленію острыхъ вкусовыхъ веществъ, у взрослыхъ и у дѣтей. Но, къ сожалѣнію, я такъ былъ стѣсненъ въ выборѣ матеріала и случайностями ¹⁾, что мнѣ удалась справиться съ ничтожной долей моей задачи.

Для опытовъ брались здоровые люди, въ возрастѣ отъ 22—30 лѣтъ, при чемъ особенное вниманіе обращалось на правильную дѣятельность желудочно-кишечнаго канала. Передъ началомъ опыта они, до установки вѣсѣ тѣла приблизительно на одной и той-же величинѣ, питались исключительно той пищей, которая вводилась во все время наблюденія. Введеніе пищи не ограничивалось какой нибудь разъ опредѣленной величиной; предлагалось ѣсть „до сыта“, это было важно въ виду того, что количество пищи, разъ на всегда установленное во все время наблюденія, могло различно усваиваться при желаніи и нежеланіи ѣсть и, съ другой стороны, интересно было опредѣлить вліяніе горчицы и перца на аппетитъ.

Вводимыя пищевыя вещества были по возможности разнообразны для того, что бы, съ одной стороны, не измѣнять рѣзко діеты, къ которой привыкъ наблюдаемый, а съ другой, чтобы однообразіе діеты не внушало отвращенія къ ней и, такимъ образомъ, не измѣняло бы результатовъ усвоенія во время опытовъ, продолжавшихся болѣе или менѣе долгое время.

Составъ пищи и количество ея я здѣсь не привожу, такъ какъ все это видно изъ таблицъ. Отмѣчу только, что

¹⁾ Повышенія ^т отъ случайныхъ причинъ; жидкія испраженія, не допускавшія раздѣленія кала двухъ періодовъ.

въ нѣкоторыхъ опытахъ давался бульонъ, который приготовлялся такимъ образомъ: 5 грм. сухаго обыкновеннаго продажнаго бульона,, изслѣдованнаго на количество азота, варилося въ 250 к. ц. воды съ прибавкой поваренной соли.

Количество горчицы и перца тоже не опредѣлялось: оно зависѣла отъ того количества мяса и хлѣба, которое съѣдалось въ дни опыта.

Кромѣ того, люди, привычные къ этимъ веществамъ, съѣдали ихъ больше, непривычные—меньше.

Горчица приготовлялась такимъ образомъ: бралось 50 грм. обыкновенной продажной горчицы лучшаго сорта ¹⁾, такъ называемой „Сарентской“ и къ нимъ прибавлялось 80 грм. теплой воды. Получившаяся каша тщательно растиралась отъ комковъ до полученія совершенно однообразной массы, складывалась въ банку и закупоривалась, откуда она и отвѣшивалась для каждаго употребленія.

Сортъ перца, употреблявшагося для опытовъ, былъ *pirer pigum*, извѣстный въ продажѣ подъ именемъ „Русскаго“. Зерна его отбирались отъ случайныхъ примѣсей, стирались въ порошокъ и хранились въ закупоренной банкѣ.

Выпиваемая жидкость (чай) по возможности ограничивалась (сообразуясь съ привычкой) произвольно выбраннымъ, но болѣе или менѣе опредѣленнымъ количествомъ на время опыта.

Теперь я перейду къ нѣкоторымъ частностямъ опытовъ.

За 18—20 час. до начала опыта введеніе пищи прекращалось. Опытъ начинался съ выведенія мочи и, по возможности, кала, послѣ чего изслѣдуемые взвѣшивались и получали одинъ чай. Черезъ 3—4 часа послѣ чая они получали чернику и черезъ 1—2 часа обѣдъ, а вечеромъ ужинъ, состоявшій изъ той-же пищи

¹⁾ Отъ Штоля и Шмидта.

Количество азота опредѣлялось во всѣхъ вводимыхъ пищевыхъ веществахъ (кромѣ чая, въ которомъ оказалось ничтожное количество азота Теръ-Григорьянцъ ¹⁾), Гопадзе ²⁾, а также въ мочѣ и калѣ по способу Кіельдаля-Бородина, такимъ образомъ, какъ онъ описанъ М. Г. Курловымъ и А. П. Коркуновымъ. Я не буду утомлять читателя описаніемъ этого способа, такъ какъ онъ давно уже сдѣлался обычнымъ въ клиникѣ и потому много разъ описанъ ³⁾.

Для опытовъ служили студенты младшаго (3-го курса) военно-медицинской академіи, я самъ и два человѣка, которые находились подъ постояннымъ моимъ наблюденіемъ и за которыхъ я могъ вполне поручиться въ томъ, что они исполняютъ всѣ мои требованія.

Въ пяти опытахъ давалась горчица и въ четырехъ — перецъ.

Ислѣдуемыхъ привычныхъ къ горчицѣ, т. е. употреблявшихъ ее съ пищей часто, но не каждый день было двое: Н. Р—ковъ (опытъ 2) и авторъ (опытъ 1), Войтяцкій (опытъ 5) употребляетъ ее рѣдко, а Сущинскій и П—ская—никогда.

Что касается привычки къ перцу, то всѣ четыре ислѣдуемыхъ очень рѣдко употребляли перецъ.

Хотя изъ пяти опытовъ въ четырехъ ‰ усвоеннаго азота увеличился при употребленіи горчицы, однако увеличеніе это было слишкомъ ничтожно, такъ какъ самое большее абсолютное количество усвоеннаго азота при гор-

¹⁾ Теръ-Григорьянцъ. Къ вопросу о вліяніи обильнаго питья воды на азотистый обмѣнъ и усвоеніе азотистыхъ частей пищи у здоровыхъ людей. Дисс. 1886 г.

²⁾ Гопадзе. Вліяніе массажа на азотистый обмѣнъ и усвоеніе азотистыхъ частей пищи. Дисс. 1886 г.

³⁾ А. П. Коркуновъ и М. Г. Курловъ. Врачъ 1885 г. № 5. М. Г. Курловъ. „Врачъ“ 1885 г. № 21. Военно-Медицинскій журналъ 1886 г. № 1. Статья проф. А. П. Бородина.

чицѣ превосходило азотъ контрольнаго періода всего на 6 грм.

Процентъ усвоеннаго азота при горчицѣ повысился тоже незначительно у четырехъ изслѣдуемыхъ. Изъ нихъ двое (оп. 1-й и 2-й) люди привычные къ горчицѣ. Слѣдовательно, въ этихъ опытахъ надобно принять во вниманіе слѣдующее соображеніе: представляетъ ли въ данномъ случаѣ увеличенное усвоеніе азота результатъ усиленной дѣятельности пищеварительныхъ путей, вызванной введеніемъ горчицы, или наоборотъ, меньшее усвоеніе въ періодъ безъ горчицы, есть результатъ отсутствія привычнаго раздраженія желудочно-кишечнаго канала, такъ что въ этомъ случаѣ получалось бы не увеличеніе усвоенія при горчицѣ, а уменьшеніе обычнаго усвоенія безъ нея.

У непривычныхъ, въ оп. 3 процентъ усвоеннаго азота повысился на 0,4⁰%, въ оп. 5 на 1,3⁰% (но абсолютное колич. его уменьшилось), а въ оп. 4 понизился на 1,5⁰%.

Такимъ образомъ, принимая во вниманіе результаты всѣхъ опытовъ, приходится придти къ заключенію, что горчица не оказываетъ какого либо опредѣленнаго вліянія на усвоеніе азота.

Опыты съ перцемъ во всѣхъ 4-хъ случаяхъ дали отрицательные результаты. Процентъ усвоенія азота во всѣхъ четырехъ опытахъ былъ ниже (на 0,4—2,3⁰%) при введеніи перца, чѣмъ безъ него.

Количество введенной плотной пищи при употребленіи горчицы увеличилось въ 4-хъ случаяхъ, а при перцѣ только въ одномъ. Тѣмъ не менѣе въ виду того, что колебанія азота при горчицѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ были въ сторону повышенія, а не пониженія (какъ при перцѣ), — чѣмъ объяснить подобныя повышенія?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ при настоящемъ состояніи нашихъ знаній о вкусовыхъ веществахъ еще не возможенъ, поэтому приходится возвращаться въ области предпо-

ложеній. Voit ¹⁾ предполагаетъ, что вкусовыя вещества оказываютъ вліяніе на процессы пищеваренія и питанія своимъ дѣйствіемъ на нервную систему. Онъ говоритъ, что вкусовыя и пахучія вещества различнаго рода пищи, кромѣ возбуждающаго дѣйствія на вкусовыя и обонятельныя органы, вліяютъ еще на многія другія части кишечнаго канала и извѣстнымъ образомъ готовятъ его для пищеваренія. Есть данныя предполагать, что гипотеза Людвигъ ²⁾, служившая для объясненія дѣйствія горькихъ средствъ непосредственнымъ раздраженіемъ чувствительныхъ нервовъ секреторныхъ железъ будетъ приложима для объясненія дѣйствія нѣкоторыхъ острыхъ вкусовыхъ средствъ. Нѣтъ никакого основанія думать, что горчичникъ, вызывающій на кожѣ, въ мѣстѣ приложенія, боль, рѣзкую гиперемію ея и повышеніе температуры, чтобы тотъ же горчичникъ, введенный въ желудокъ, не дѣйствовалъ аналогичнымъ образомъ на слизистую оболочку. И дѣйствительно, опыты на животныхъ съ горчичнымъ эфирнымъ масломъ, какъ уже выше было приведено, показали явленія гипереміи слизистой оболочки желудка, которыя доходили до рѣзко выраженныхъ картинъ воспаленія (отъ большихъ и токсическихъ дозъ).

Съ другой стороны, опыты доктора Чельцова ³⁾ ясно показали продолжительное увеличеніе отдѣленія желудочнаго сока у собакъ подъ вліяніемъ горчицы и перца, не смотря на то, что въ этихъ опытахъ былъ опущенъ очень важный моментъ, именно введеніе этихъ веществъ черезъ ротъ, ибо есть основаніе думать, что раздраженіе слизистой оболочки рта вызвало-бы отраженнымъ образомъ и раздраженіе слизистой оболочки желудка. Въ этомъ на-

¹⁾ I. с.

²⁾ Kohler Vierteljahrsh. fur die practische Heilk. 1873 г.

³⁾ I. с.

правленіи существуютъ непосредственныя опыты Högyes'a ¹⁾ съ капсиколомъ надъ собаками. При приложеніи капсиколоа къ слизистой оболочкѣ желудка (черезъ фистулу) онъ наблюдалъ красноту ея и немедленное наполненіе складокъ ея желудочнымъ сокомъ. Тѣже самыя явленія на слизистой оболочкѣ желудка онъ получалъ при приложеніи капсиколоа къ языку. Но такъ какъ опыты надъ усвоеніемъ азота не дали опредѣленныхъ результатовъ, а качество желудочнаго сока подъ вліяніемъ горчицы не было изслѣдовано, — приходится предположить, что оно не соотвѣтствовало составу нормальнаго желудочнаго сока.

Почему не получилось увеличенія усвоенія ни въ одномъ изъ 4-хъ случаевъ при употребленіи перца, я не могу отвѣтить. Можетъ быть дозы перца были слишкомъ велики или малы для данныхъ субъектовъ. Кромѣ того, присутствіе горькой смолы въ перцѣ приближаетъ его, можетъ быть, по отношенію къ слизистой оболочкѣ человѣческаго желудка къ горькимъ веществамъ. Разсматривая цифры, показывающія азотистый обмѣнъ, мы не находимъ въ нихъ какихъ бы то ни было правильныхъ измѣненій, а потому необходимо предположить, что горчица и перецъ на обмѣнъ азота не оказываютъ какого либо опредѣленнаго вліянія.

Вліяніе горчицы на измѣненіе количества выдѣленной мочи изъ моихъ опытовъ не видно, не смотря на то, что Lauder Brounton ²⁾ прямо относитъ горчицу къ мочегоннымъ.

Въ моихъ опытахъ вліяніе горчицы и перца на количество выдѣленія мочи рѣшалось такимъ образомъ: вся выпиваемая жидкость (чай, молоко, бульонъ) точно также, какъ и моча тщательно измѣрялись. Бралась сумма того и другаго за каждый періодъ отдѣльно (безъ агента и съ агентомъ) и дѣлалось вычисленіе процента мочи по отношенію къ введенной жидкости, чтобы рѣшить вопросъ,

¹⁾ Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacologie. 1878. Стр. 122.

²⁾ Test—book of Pharmacology и т. д., London, 1885, стр. 379.

какой процентъ изъ введенной жидкости выдѣлился мочей. Рѣшая дѣло такимъ способомъ, мнѣ казалось возможнымъ избѣжать ошибки, которая могла бы произойти, если бы увеличенное отдѣленіе мочи, появившееся вскорѣ послѣ употребленія горчицы или перца, смѣнилось компенсаторнымъ уменьшеніемъ его.

Само собою разумѣется, что отсутствіе величинъ легочно-кожныхъ потерь во время опытовъ затемняетъ дѣло и для окончательнаго рѣшенія вопроса о мочегонномъ дѣйствіи какого нибудь средства, такимъ способомъ необходимо вычислять количество легочно-кожныхъ потерь. Но я не дѣлалъ этого расчета, такъ какъ это слишкомъ расширило бы мою задачу и почти удвоило-бы число цифръ ¹⁾. Здѣсь же я только мимоходомъ указываю какъ на замѣченное мною явленіе, такъ и на его цѣну.

И такъ, при той обстановкѣ, которая была въ моихъ опытахъ, я при употребленіи горчицы мочегоннаго дѣйствія ея не замѣтилъ.

При употребленіи же перца, наоборотъ, изъ четырехъ опытовъ въ трехъ ‰ воды, выдѣленной мочей, увеличился. Это зависитъ, можетъ быть, отъ присутствія въ перцѣ эфирнаго масла изомернаго терпентину.

И дѣйствительно, моча при употребленіи перца тотчасъ послѣ мочеиспусканія имѣетъ особенный характерный запахъ, — обстоятельство, на которое обратили вниманіе сами испытуемые.

Въ одномъ случаѣ (опытъ 6) количество мочи при употребленіи перца увеличилось на 4,2‰; въ другомъ на 14,8‰ и въ третьемъ на 3‰.

Изъ неблагопріятныхъ сторонъ дѣйствія горчицы и перца, я долженъ отмѣтить слѣдующія:

Въ пяти неприведенныхъ здѣсь опытахъ, вскорѣ послѣ

¹⁾ Кромѣ этого изслѣдуемые жили при однихъ и тѣхъ-же условіяхъ въ клиникѣ.

употребленія горчицы (у непривычныхъ людей), появлялись колики, доходившія иногда до чрезвычайно сильныхъ болей, заставлявшихъ изслѣдуемыхъ ложиться въ постель. Затѣмъ, появлялся поносъ (до 10 испражнений въ сутки), продолжавшійся нѣсколько дней, не смотря на немедленное прекращеніе опыта. Въ одномъ случаѣ тотчасъ же послѣ прекращенія опыта (опытъ 4) у изслѣдуемаго начались колики и поносъ (8—10 испражнений въ сутки), продолжавшіеся довольно долго.

Что касается перца, то изъ пяти опытовъ въ одномъ случаѣ начались боли въ области живота на 4-й день употребленія перца и введеніе его было тотчасъ же прекращено. Дѣло обошлось безъ жидкихъ испражнений, а въ другомъ случаѣ (студ. Любомудровъ, опытъ съ которымъ не приведенъ) сильныя колики сопровождались нѣсколькими жидкими испражнениями и опытъ по этому былъ прекращенъ.

То и другое вещество ни разу не вызывало рвоты.

II.

Чтобы получить точное представленіе объ усвоеніи жира, необходимо, само-собою разумѣется, знать количество жира, введеннаго и выведеннаго въ опредѣленный промежутокъ времени. Разница между этими величинами и показала бы количество всосаннаго жира. Но при рѣшеніи этого вопроса мы получаемъ числа не одноименныя, что не позволяетъ сдѣлать необходимаго вычитанія количества не всосаннаго жира изъ введеннаго.

Дѣло въ томъ, что, опредѣляя количество жира въ вводимой пищѣ (молокъ, хлѣбъ, яйца и т. п.), мы получаемъ жиръ какъ таковой и ничтожное количество кислотъ; между тѣмъ какъ въ калѣ мы имѣемъ дѣло съ

нейтральнымъ жиромъ, жирными кислотами и различными ихъ солями (мылами). Это затрудненіе могло бы быть обойдено при существованіи двухъ возможностей. Во-1-хъ, обративъ жиры пищи и жиры, жирныя кислоты и мыла кала въ жирныя кислоты, судить о количествѣ усвоеннаго жира по количеству усвоенныхъ жирныхъ кислотъ. Или, во-2-хъ, обративъ жирныя вещества кала въ кислоты и вычисливъ по ихъ формуламъ соотвѣтствующія имъ количества жировъ, вычесть полученное изъ количества введеннаго жира.

Но и здѣсь встрѣтилось-бы еще болѣе серьезное препятствіе, состоящее въ томъ, что пришлось-бы въ данномъ калѣ опредѣлить, съ какими кислотами мы имѣемъ дѣло, а главное, предстояло-бы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ рѣшить вопросъ о количественномъ соотношеніи этихъ кислотъ между собою. Тогда только, зная количество каждой жирной кислоты въ отдѣльности, возможно было-бы вычислить соотвѣтствующія имъ количества жира.

Но это обстоятельство настолько усложнило-бы дѣло, что рѣшеніе его для одного только случая представляло-бы слишкомъ большую задачу. И при этомъ условіи приложеніе этого метода врядъ-ли было-бы осуществимо въ клиникѣ. Поэтому приходится ограничиваться тѣмъ, что, опредѣливъ количество жира въ пищѣ и жирныхъ кислотъ въ калѣ, относиться къ нимъ, какъ къ величинамъ одноименнымъ, при томъ однако условіи, чтобы количество вводимаго жира во все время опыта было приблизительно одинаковымъ.

Когда въ контрольномъ періодѣ и въ періодѣ съ тѣмъ или инымъ изучаемымъ вліяніемъ вводится жира неодинаковое количество, спрашивается, можно-ли въ такомъ случаѣ составить понятіе объ усвоеніи жира подъ вліяніемъ испытываемаго вещества. На первый взглядъ кажется, что этого можно достигнуть опредѣленіемъ, насколько процен-

товъ количество введеннаго жира во второмъ періодѣ превышаетъ или менѣе, сравнительно съ 1-мъ. И, затѣмъ, опредѣливъ таковое процентное отношеніе между количествами введенныхъ жирныхъ кислотъ двухъ періодовъ, изъ сравненія этихъ процентовъ рѣшаютъ вопросъ объ усиленіи или ослабленіи всасываемости жира при изучаемомъ вліяніи.

Положимъ, что во 2-мъ періодѣ (съ агентомъ) введено жира на 5⁰/₁₀₀ болѣе перваго (контрольнаго) періода, при прочихъ равныхъ условіяхъ, а жирныхъ кислотъ въ калѣ 2-го періода выдѣлилось на 10⁰/₁₀₀ болѣе перваго. Такія данныя давали-бы, повидимому, право заключать, что во 2-мъ періодѣ всасываніе жира было ослаблено. При существованіи же обратныхъ условій и заключеніе было-бы обратное. Однако подобныя заключенія были-бы возможны только въ такомъ случаѣ, если-бы было доказано, что само количество введеннаго жира не вліяетъ на его всасываемость.

Въ этомъ отношеніи вопросъ еще мало разработанъ и въ литературѣ имѣются различныя указанія по этому поводу.

Такъ, Rubner ¹⁾ сдѣлалъ нѣсколько опытовъ надъ здоровыми людьми, гдѣ онъ, кромѣ мяса и хлѣба, вводилъ различныя количества жира и масла. Вычисляя процентъ и абсолютное количество неусвоеннаго жира, онъ пытался опредѣлить, какія количества жира могутъ всасываться (опыты продолжались по два дня). Оказалось, что при введеніи въ одномъ случаѣ 100 грм. жира ежедневно, а въ другомъ 200 грм., абсолютное количество неусвоеннаго жира почти не измѣнялось.

При введеніи же 240 грм. масла (Butter) каломъ было выведено вдвое меньшее количество неусвоеннаго жира, чѣмъ при 200 грм. сала.

Въ этомъ опытѣ врядъ ли можно лучшее усвоеніе жира

¹⁾ Zeitschrift für Biologie. 1879. Bd. V. Стр. 170—178.

отнести цѣликомъ къ количеству масла. Самъ Rubner того мнѣнія, что жиръ масла усваивается въ большихъ количествахъ, нежели жиръ сала.

Въ 4 опытѣ было введено въ среднемъ въ день 145,8 грм. сала и 204,6 грм. высушеннаго масла: каломъ было выведено неусвоеннаго жира 12,7% и абсолютное количество неусвоеннаго жира рѣзко увеличилось сравнительно съ предъидущими опытами. Такимъ образомъ, отсюда, по видимому, можно заключить, что абсолютное количество неусвоеннаго жира не возвышается пропорціонально величинѣ прихода его до опредѣленнаго maximum'a. Затѣмъ, по мнѣнію Rubner'a, при дальнѣйшемъ увеличеніи введенія жира, вполне возможно, что выведение его будетъ еще болѣе. Что касается % содержанія неусвоеннаго жира въ калѣ въ зависимости отъ количества введеннаго жира, то отношенія эти въ опытахъ Rubner'a такіа:

| | Введено жира. | Выведено каломъ. | |
|----------|-------------------------------|------------------|---------|
| Опытъ 1) | 100 грм. сала | 17,4 | } въ %. |
| „ 2) | 200 грм. сала | 7,8 | |
| „ 3) | 240 грм. масла | 2,7 | |
| „ 4) | 145,8 грм. сала и 204,6 масла | 12,7 | |

Слѣдовательно, повидимому, % неусвоеннаго жира уменьшается при введеніи большихъ количествъ жира до извѣстнаго предѣла. Но дѣло затемняется въ этихъ опытахъ именно тѣмъ, что вводился жиръ разнаго качества.

Болѣе точный отвѣтъ на поставленный вопросъ даетъ д-ръ Черновъ ¹⁾ въ своей работѣ „о всасываніи жира взрослыми и дѣтьми во время лихорадочныхъ заболѣваній и виѣ ихъ“. Вводя жиръ здоровымъ собакамъ въ видѣ молока съ различнымъ содержаніемъ жира, онъ приходитъ къ выводу, что при увеличеніи жира въ пищѣ % содержаніе его въ испражненіяхъ увеличивается, но что въ то же время происходитъ и большее его усвоеніе организ-

¹⁾ В. Е. Черновъ. Дисс. 1883. Петербургъ.

момъ. Гораздо раниѣе проф. С. П. Боткинъ ¹⁾, работая надъ всасываніемъ жира въ кишкахъ, вводя разныя количества жира одного сорта, приходитъ къ убѣжденію, что чѣмъ больше дано жира, тѣмъ больше его всасывалось. Что же касается $\%$ неусвоеннаго жира въ калѣ, то онъ падалъ при введеніи большихъ количествъ жира. Слѣдовательно, результаты опытовъ Rubner'a согласны съ таковыми же С. П. Боткина.

Во всякомъ случаѣ, остается пожелать, чтобы дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи окончательно выяснили этотъ важный вопросъ.

Но если мы будемъ вводить одному и тому же объекту приблизительно одно и то же количество однообразнаго жира, то при прочихъ равныхъ условіяхъ, будетъ ли измѣняться количество невсосаннаго жира въ испражненіяхъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находимъ въ работѣ д-ра Чернова. Въ опытахъ (надъ собаками), въ которыхъ онъ вводилъ большое количество жира, онъ убѣдился, что, „если взять и сравнить $\%$ содержанія жира въ экскрементахъ, взятыхъ за различныя сутки при пищѣ съ большимъ содержаніемъ жира, то оказывается, что оно почти одно и то же“.

Что касается вліянія воды на $\%$ усвоенія жира, то С. П. Боткинъ ²⁾ показалъ, (въ опытахъ надъ собаками), что отъ прибавленія воды всасываніе жира уменьшается. Однако, онъ доказалъ также, что „извѣстная степень разжиженія пищи необходима для того, чтобы всасываніе не понизилось“.

Д-ръ Черновъ ³⁾ пришелъ къ противоположному выводу, именно, что увеличенное содержаніе воды въ пищѣ

¹⁾ С. П. Боткинъ. О всасываніи жира въ кишкахъ. Дисс. 1860. Петербургъ.

²⁾ 1. с.

³⁾ 1. с.

не вліяеть замѣтнымъ образомъ на большую или меньшую способность всасыванія жира организмомъ. Такое разнорѣчіе зависить, можетъ быть оттого, что жиръ, вводимійся обоими изслѣдователями былъ различнаго свойства (мозговой жиръ и жиръ молока).

Слѣдовательно, на основаніи вышеизложенныхъ данныхъ, для рѣшенія вопроса о вліяніи какого-нибудь агента на усвоеніе жира, необходимо вводить во все время наблюденія одно и то же количество однообразнаго жира и воды, — конечно, по скольку это возможно при опытахъ на человѣкѣ. Тогда только, принимая количество введеннаго жира за единицу, можно съ извѣстной степенью вѣроятія судить о томъ или другомъ измѣненіи въ его усвоеніи.

Руководясь этими соображеніями я и сдѣлалъ два опыта надъ усвоеніемъ жира молока подъ вліяніемъ горчицы.

Для того, чтобы удобнѣе было вводить одновременно горчицу и молоко, мнѣ пришлось къ молочной діетѣ прибавить еще крутой куриный бѣлокъ, тщательно очищенный отъ желтка (для освобожденія бѣлка отъ жира) и бѣлый хлѣбъ.

Конечно, хлѣбъ и бѣлокъ могли, можетъ быть, до нѣкоторой степени измѣнить всасываніе жира, но, во-первыхъ, въ изслѣдованіяхъ надъ человѣкомъ нельзя обставить опытъ со всею необходимою строгостью; во-вторыхъ, опыты Rubner'a надъ вліяніемъ сыра на количества усвоеннаго жира изъ молока, давали мнѣ на это нѣкоторое право, ибо изъ его опытовъ видно, что количество сыра не измѣняло сколько нибудь замѣтнымъ образомъ усвоенія молочнаго жира. Наконецъ, такъ какъ хлѣбъ и бѣлокъ вводились въ продолженіи всего опыта, то условія для періода съ изслѣдуемымъ веществомъ и безъ него были одинаковы.

Обстановка опытовъ была та же, что и при усвоеніи

азота съ тою разницею, что здѣсь въ вводимой нищѣ, а также въ калѣ вмѣсто азота опредѣлялось количество жировыхъ веществъ. Количество жира въ бѣломъ хлѣбѣ не опредѣлялось, потому что употреблялся хлѣбъ, приготовленный безъ масла, и во избѣжаніе того жира, который могъ пристать къ коркѣ вслѣдствіе условій печенія, давался только мякишъ.

Что же касается жира, который содержится въ самой пшеничной мукѣ, то я имъ пренебрегъ, потому что его въ ней ничтожное количество сравнительно съ тѣмъ количествомъ жира, которое я вводилъ въ видѣ молока. И, наконецъ, такой изслѣдователь, какъ Rubner, то же не опредѣлялъ жира въ хлѣбѣ, спеченномъ безъ масла.

Переходя теперь къ методамъ извлеченія жира изъ молока и кала, я не буду останавливаться на всѣхъ способахъ, приведенныхъ въ литературѣ, ибо большинство ихъ совершенно однообразны и представляютъ незначительные варианты.

Я останавлиюсь только на тѣхъ способахъ, которые представляютъ болѣе или менѣе значительныя отклоненія одинъ отъ другаго.

Способъ получения жировъ, жирныхъ кислотъ и холестерина изъ различныхъ веществъ предложенный Гоппе-Зейлеромъ ¹⁾ слѣдующій:

„Жидкости или ткани, содержація вышеназванныя вещества, выпариваютъ на водяной банѣ до суха, превращаютъ остатокъ въ мелкій порошокъ, выщелачиваютъ его эфиромъ, а нерастворившуюся въ эфирѣ часть остатка повторно обрабатываютъ затѣмъ кипящимъ алкоголемъ. Еще горячую алкогольную вытяжку фильтруютъ, выпариваютъ на водяной банѣ до суха и остатокъ выщелачиваютъ эфиромъ. Масса, получаемая послѣ удаленія эфира изъ соединенныхъ эфирныхъ экстрактовъ, кромѣ жировъ

¹⁾ Гоппе-Зейлеръ. Руководство къ физиолого и патолого-химическому анализу. Переводъ проф. Шербакова. 1876 г.

можетъ содержать еще жирныя кислоты и холестеринъ; въ ней могутъ заключаться также и красящія вещества. Для того, чтобы отдѣлить жиры отъ свободныхъ жирныхъ кислотъ, остатокъ отъ эфирной вытяжки кипятятъ нѣкоторое время съ концентрированнымъ растворомъ углекислаго натра, который не омыляетъ жировъ; потомъ смѣсь выпариваютъ до-суха, прибавляютъ небольшое количество воды и взбалтываютъ съ эфиромъ. Жиры и холестеринъ переходятъ при этомъ въ эфирный растворъ. Для того, чтобы отдѣлить жиръ отъ холестерина, можно предоставить эфирную вытяжку произвольному испаренію и по выпаденіи холестерина слить остающійся растворъ; но этимъ путемъ можно достигнуть лишь неполнаго отдѣленія. Для полнаго отдѣленія смѣсь жировъ и холестерина слѣдуетъ кипятить нѣкоторое время на водяной банѣ съ алкогольнымъ растворомъ ѣдкаго кали, удалять потомъ выпариваніемъ алкоголь, остающуюся массу сильно разводить водою и взбалтывать потомъ съ эфиромъ; если было прибавлено достаточное количество воды, то въ эфирной вытяжкѣ содержится теперь только одинъ холестеринъ.

„Водный растворъ мыловъ прежде, чѣмъ удалить изъ него послѣдніе остатки эфира, хорошо подкисляютъ разведенною сѣрною кислотою и нагреваютъ потомъ на водяной банѣ до удаленія эфира, выдѣлившіяся жирныя кислоты отфильтровываютъ, фильтратъ нейтрализуютъ амміакомъ, сгущаютъ на водяной банѣ до незначительнаго объема и выщелачиваютъ алкоголемъ. Профильтрованная алкогольная вытяжка содержитъ глицеринъ и слѣды сѣрно-кислыхъ солей; эти послѣднія можно удалить такимъ образомъ, что остатокъ по удаленіи алкоголя растираютъ съ окисью свинца, выщелачиваютъ массу небольшимъ количествомъ воды, осаждаютъ сѣроводородомъ, фильтруютъ и выпариваютъ фильтратъ до густоты сиропа. Остающійся теперь глицеринъ можетъ быть узнанъ по его вкусу, по

растворимости въ немъ гидрата окиси мѣди и по образованію акролеина при нагрѣваніи съ безводною фосфорною кислотою“.

Для общаго изслѣдованія нормальнаго кала Гоппе-Зейлеръ совѣтуетъ поступать такимъ образомъ: „Изслѣдуемый калъ растираютъ съ большимъ количествомъ алкоголя, фильтруютъ, остатокъ выщелачиваютъ эфиромъ, къ нерастворившемуся остатку прибавляютъ соляной кислоты и еще разъ выщелачиваютъ эфиромъ. Алкогольная вытяжка содержитъ въ себѣ гидробилирубинъ, жирныя кислоты, свободныя или же соединенныя съ амміакомъ или ѣдкими щелочами, желчныя кислоты, небольшое количество холестерина, жиръ и соли. Первая эфирная вытяжка содержитъ въ себѣ послѣдніе остатки жира; эфирная вытяжка послѣ прибавленія соляной кислоты растворяетъ жирныя кислоты, именно пальмитиновую и стеариновую, которыя находились въ калѣ въ видѣ известковыхъ солей ¹⁾).

Что-же касается выдѣленія холевой кислоты, то Гоппе-Зейлеръ даетъ слѣдующій способъ: „изъ кала или содержащаго толстыхъ кишекъ холевая кислота можетъ быть выщелачиваема виолнѣмъ. Профильтрованную вытяжку выпариваютъ на водяной банѣ, прибавляютъ къ остающемуся сиропу небольшое количество уксусной кислоты и остатокъ выщелачиваютъ холодною водою. Нерастворившуюся въ водѣ массу обливаетъ баритовою водою, нагрѣваютъ, прибавляютъ воды и пропускаютъ углекислоту до нейтральной реакціи; теперь смѣсь кипятятъ и еще горячую фильтруютъ, нерастворившійся остатокъ долгое время кипятятъ съ водою до тѣхъ поръ, пока въ ней что либо будетъ растворяться, выпариваютъ соединенныя, профильтрованныя еще горячими вытяжки до незначительнаго объема; прибавляютъ сначала по охлажденіи небольшое количество эфира, а потомъ соляной кислоты, тща-

¹⁾ Гоппе-Зейлеръ. Стр. 588.

тельно взбалтывают и оставляют стоять на некоторое время, причем эфиръ может испариться. Тогда фильтруют, промывают выдѣлившуюся холевую кислоту небольшимъ количествомъ воды, растворяют ее алкоголемъ, въ случаѣ надобности обезцвѣчивают животнымъ углемъ, выпаривают до незначительнаго объема и оставляют стоять до кристаллизаціи ¹⁾“.

Такимъ образомъ, Гонпе-Зейлеръ даетъ способъ отдѣленія жировъ, жирныхъ кислотъ и холестерина. Но онъ не даетъ систематическаго хода анализа кала на количество содержащихся въ немъ живовыхъ веществъ и на отдѣленіе ихъ отъ веществъ постороннихъ.

Въ началѣ нынѣшняго года д-ръ Müller ¹⁾ въ своей большой работѣ объ усвоеніи жира у желтушныхъ пользовался способомъ опредѣленія жира въ калѣ, значительно отличающимся отъ способа Гонпе-Зейлера.

Müller предварительно сушилъ изслѣдуемый калъ, растиралъ его въ порошокъ и извлекалъ эфиромъ въ аппаратѣ Soxhlet'a въ теченіи трехъ дней. Затѣмъ эфирный экстрактъ выпаривался до суха, растворялся въ безводномъ эфирѣ, фильтровался и сушился.

Остатокъ кала (послѣ вытягиванія его эфиромъ) кипятился въ алкоголѣ подкисленномъ HCl, сушился и вторично извлекался эфиромъ.

Такимъ образомъ первый эфирный экстрактъ содержалъ нейтральные жиры, жирныя кислоты и слѣды мыль (холестерина Müller не опредѣлялъ, потому что онъ нашелъ ничтожное количество его въ желтушномъ калѣ. По всей вѣроятности по этой же причинѣ онъ не дѣлалъ количественнаго опредѣленія и холевой кислоты).

Второй экстрактъ разсматривался, какъ жирныя кислоты, полученныя изъ мыль.

¹⁾ Гонпе-Зейлеръ. Стр. 127.

²⁾ Zeitschrift für Klinische Medicin. Тетради 1 и 2. 1887 г. Стр. 45 и далѣе.

Для удаленія излишнихъ жирныхъ кислотъ до валерьяновой, а также и мыль, которыя частью были увлечены эфиромъ—первый экстрактъ повторно промывался небольшими порціями горячей воды, послѣ чего онъ высушивался и взвѣшивался. Во взвѣшенномъ экстрактѣ остались, слѣдовательно, нейтральные жиры и свободныя жирныя кислоты, нерастворимыя въ водѣ. Чтобы опредѣлить количество кислотъ въ этомъ экстрактѣ Müller титровалъ ихъ алкогольнымъ растворомъ KNO (по Hoffmann'у) ¹⁾ при чемъ индикаторомъ конца реакціи служилъ фенолфталеинъ. Для этого опредѣленная часть 1-го экстракта растворялась въ тепломъ спиртѣ съ небольшимъ количествомъ эфира и затѣмъ уже титровалась.

Такъ какъ цифры полученныя имъ посредствомъ титрованія не вполне соответствовали цифрамъ полученнымъ по способу Гоппе-Зейлера, то онъ произвелъ нѣсколько контрольных опытовъ, заключавшихся въ томъ, что онъ сравнивалъ величины, полученныя титрованіемъ чистой стеариновой и олеиновой кислотъ съ таковыми же, полученными путемъ взвѣшиванія. При чемъ литръ спиртнаго раствора KNO былъ поставленъ такимъ образомъ, что 10 куб. ц. его соответствовали 1,75 нормальнаго раствора H_2SO_4 , а слѣдовательно, 1 куб. ц. = 0,0496 стеариновой кислоты.

Я приведу нѣсколько данныхъ изъ его опытовъ:

1) 4,885 грм. чистой стеариновой кислоты потребовали 85 куб. ц. раствора KNO , что соответствуетъ 4,22 грм. стеариновой кислоты.

2) 0,210 грм. стеариновой кислоты при титрованіи дали 0,208.

3) 0,1045 грм. стеарин. кисл. при титр. дали 0,109.

4) 0,9035 грм. стеарин. кисл. при титр. дали 0,893.

5) 0,053 грм. стеарин. кисл. при титр. дали 0,045.

¹⁾ Maly Jahresber. V. S. 36. Цитирую по Muellery.

Изъ этихъ цифръ видно, что ошибка при титрованіи достигала до 12⁰/о (опытъ 1) и, кромѣ того, способъ титрованія давалъ всегда цифры менѣе полученныхъ путемъ взвѣшиванія. Но, по мнѣнію Müller'a, ошибка эта компенсируется тѣмъ, что онъ титруя всѣ жирныя кислоты каала (слѣдовательно и болѣе легкія, нежели стеариновая), — все разсчитывалъ на стеариновую кислоту (болѣе тяжелую).

Другую порцію перваго эфирнаго экстракта онъ сжигалъ и получалъ до 5⁰/о по вѣсу золы. Изъ этого Müller заключаетъ, что мыла значительно растворимы въ безводномъ эфирѣ. Зола эта не всегда была щелочной реакціи, ибо она кромѣ слѣдовъ соляной и сѣрной кислотъ содержала значительное количество фосфорной кислоты — болѣе, чѣмъ требуется для насыщенія кальція и магнія. Такъ какъ золы было больше при смѣшанной пищѣ, а не при молокѣ, то Müller думаетъ, что часть фосфорной кислоты происходитъ изъ лецитина пищи. Вѣсъ этой золы онъ вычиталъ изъ эфирнаго экстракта.

Такимъ образомъ, зная количество жирныхъ кислотъ и золы въ 1 экстрактѣ, онъ приблизительно могъ высчитать количество содержащагося въ немъ нейтральнаго жира.

Что касается 2-го экстракта, то онъ, какъ выше уже было сказано, принимался за жирныя кислоты, полученные изъ мылъ и потому высушивался и взвѣшивался.

Не смотря на всѣ предосторожности, которыя предпринималъ Müller съ цѣлью опредѣлить количество нейтральныхъ жировъ и жировыхъ кислотъ въ калѣ, онъ считаетъ необходимымъ высказать слѣдующія сомнѣнія:

1) Какъ уже было сказано, въ 1-й эфирный экстрактъ переходятъ и мыла, при томъ въ количествѣ, трудноподающемся опредѣленію, и

2) При продолжительной обработкѣ эфира мыла отдаютъ часть своихъ жирныхъ кислотъ (въ чемъ Müller убѣдился на непосредственныхъ опытахъ).

Кромѣ этого Müller приводитъ мнѣніе Лебедева ¹⁾ и собственное подтвержденіе этого мнѣнія, что послѣ тщательнаго извлеченія эфиромъ изъ обработаннаго кислотой остатка все таки переходятъ въ растворъ жирныя кислоты, въ которыхъ и по способу титрованія и по способу Гоппе-Зейлера можно доказать небольшое количество нейтральныхъ жировъ. Такимъ образомъ, Müller приходитъ къ заключенію, что такимъ способомъ невозможно точно отдѣлить жиры отъ жирныхъ кислотъ.

Поэтому онъ предлагаетъ, обработавъ изслѣдуемую порцію кала соляной кислотой, извлечь эфиромъ, такъ какъ при такомъ способѣ можно будетъ опредѣлить отношеніе нейтральныхъ жировъ (неразлагающихся кислотой) къ жирнымъ кислотамъ.

Принимая все вышесказанное во вниманіе, я рѣшилъ, при постановкѣ моихъ опытовъ, всѣ жирныя вещества кала обратить въ жирныя кислоты и не опредѣлять отношенія нейтральныхъ жировъ къ кислотамъ. Но такъ какъ я имѣлъ дѣло съ каломъ здоровыхъ людей, то мнѣ необходимо было при полученіи жирныхъ кислотъ выдѣлить холевую кислоту и холестеринъ. Наиболѣе удобнымъ способомъ для этой цѣли, мнѣ казалось, могъ служить способъ, примѣнявшійся д-ромъ Черновымъ ²⁾, работавшимъ подъ руководствомъ проф. Лачинова. Но, такъ какъ д-ръ Черновъ опредѣлялъ кромѣ жирныхъ кислотъ, полученныхъ изъ жира и какъ таковыхъ и жирныя кислоты изъ мыль, а также и количества холевой кислоты и холестерина, а мнѣ необходимо было получить только чистыя жирныя кислоты, то я и воспользовался только тѣми операціями, которыя ведутъ къ намѣченной мною цѣли.

¹⁾ Archiv für Anatomie und Physiol. 1883. S. 500.

²⁾ l. c.

Тотъ способъ опредѣленія чистыхъ жирныхъ кислотъ, который употреблялъ я, дѣлится на 5 моментовъ:

- 1) извлеченіе нейтральнаго жира;
- 2) освобожденіе жирныхъ кислотъ изъ мыль;
- 3) превращеніе жировъ и жирныхъ кислотъ въ баритовыя мыла;
- 4) выдѣленіе изъ полученныхъ мыль холестерина и холевой кислоты и
- 5) вторичное разрушеніе мыль и вытягиваніе чистыхъ уже кислотъ эфиромъ.

Исслѣдуемый калъ предварительно высушивался, взвѣшивался, растирался въ мелкій порошокъ и хранился въ хорошо закупоренной банкѣ, откуда уже и брался порціи для изслѣдованія.

Навѣска въ 8—10 грм. этого порошка ссыпалась въ цилиндръ сдѣланный изъ шведской бумаги, который помещался въ аппаратъ Soxhlet'a.

Черезъ аппаратъ пропускался нѣсколько разъ эфиръ и затѣмъ приборъ оставлялся часовъ на 18 такимъ образомъ, чтобы уровень эфира въ аппаратѣ былъ выше уровня кала.

На слѣдующій день аппаратъ пускался въ дѣйствіе часа на четыре, до тѣхъ поръ, пока капли эфира, прошедшія черезъ каловую массу, переставали давать пятна на стеклѣ. Затѣмъ, цилиндрикъ вынимался изъ аппарата, переносился въ стаканъ и высушивался, а эфирный экстрактъ выпаривался и сохранялся закупореннымъ въ колбѣ. Послѣ этого вся масса, заключавшаяся въ цилиндрикѣ, тщательно ссыпалась въ тотъ же стаканъ. Въ этотъ же стаканъ съ каловымъ порошкомъ наливался 95° спиртъ въ количествѣ въ трое—въ четверо большемъ по объему сравнительно съ порошкомъ, прибавлялась химически чистая HCl до ясно-кислой реакціи и стаканъ оставлялся часовъ 12—15 при t° 40—50° C. Затѣмъ, смѣсь эта отфильтро-

вывалась теплымъ спиртомъ и водой до уничтоженія кислой реакціи и полученный фильтратъ немного выпаривался (для уменьшенія объема) и выливался въ колбу съ эфирнымъ экстрактомъ, а осадокъ, оставшійся на фильтрѣ, выбрасывался.

Такимъ образомъ, въ колбѣ получались нейтральные жиры, свободныя жирныя кислоты, жирныя кислоты, полученные изъ мыль, холевая кислота, холестеринъ, красящія вещества и т. п.

Въ эту колбу вливалось 50 к. ц. 10% спиртнаго раствора КНО для обмыливанія упомянутыхъ жирныхъ веществъ и колба съ обратно-поставленнымъ холодильникомъ ставилась въ водяную баню. Обмыливаніе происходило около 2-хъ часовъ. Послѣ обмыливанія въ колбу прибавлялся въ избытѣкъ растворъ уксусно-кислаго барія ¹⁾ до прекращенія появленія осадка и осадокъ этотъ отфильтровывался, отмывался водой (до уничтоженія щелочной реакціи въ промывныхъ водахъ) затѣмъ слабымъ спиртомъ, крѣпкимъ и наконецъ эфиромъ.

Фильтраты водный и полученный отъ слабого спирта собирались въ фарфоровую чашку, а полученный отъ крѣпкого спирта и эфира (содержащій холестеринъ) выбрасывался. Такимъ образомъ, въ водномъ фильтратѣ получились: растворимый въ водѣ и слабомъ спиртѣ холевокислый барій и избытокъ уксуснокислаго барія, а на фильтрѣ баритовыя соли жирныхъ кислотъ.

Такъ какъ на фильтрѣ мы получили наконецъ жирныя кислоты въ видѣ баритовыхъ мыль, то этимъ можно было бы и ограничиться, но проф. П. А. Лачиновъ ²⁾ доказалъ, что холевая и стеариновая кислоты обладаютъ

¹⁾ Растворъ былъ сдѣланъ изъ уксусно-кислаго барія въ 45° спиртѣ въ количествѣ 10%.

²⁾ Berichte der Deutschen Chemisch. Gesellschaft. 1880. Стр. 1911. Журн. русск. физ.—хим. О—ва. Т. XII. 1879. Стр. 400.

способностью образовывать нѣчто въ родѣ химическаго соединенія, но весьма непостояннаго и неопредѣленнаго и поэтому отфильтрованный въ данномъ случаѣ холевокислый барій содержитъ небольшое количество стеариново-кислаго барія.

Для освобожденія жирной кислоты, увлеченной въ фильтраторъ холестериномъ, проф. П. А. Лачиновъ предложилъ разлагать холевокислый барій углекислымъ аммоніемъ, въ которомъ холевокислый барій подвергается полному разложенію, при чемъ образуется углекислый барій и холевокислый амміакъ. Баріева же соль стеариновой кислоты даже послѣ продолжительнаго нагреванія съ углекислымъ амміакомъ не подвергается почти никакому измѣненію ¹⁾.

На этомъ точномъ отдѣленіи жирныхъ кислотъ отъ холестериновой кислоты и основанъ дальнѣйшій ходъ дѣйствій.

Первый полученный нами фильтраторъ (заключающій въ себѣ холестериновую кислоту, увлекающую часть жирныхъ кислотъ) выпаривался, растворялся въ небольшомъ количествѣ амміака и разлагался избыткомъ раствора углекислаго амміака.

Полученный осадокъ фильтровался, отмывался водой, слабымъ и крѣпкимъ спиртомъ и опять эфиромъ для извлеченія холестерина, который могъ попасть въ первый фильтраторъ.

Второй фильтраторъ опять осаждается растворомъ уксусно-кислаго барія и опять отмывается для полного разъединенія холестериновой кислоты отъ жирныхъ кислотъ. Я (какъ и д-ръ Черновъ) дѣлалъ троекратное осажденіе уксусно-кислымъ баріемъ и углекислымъ аммоніемъ и послѣдній фильтраторъ, какъ содержащій холестериновую кислоту, по возможности освобожденную отъ жирныхъ кислотъ, уничтожался.

Что-же касается тѣхъ шести осадковъ, которые полу-

¹⁾ П. А. Лачиновъ. I. с.

чались на фильтрахъ и состояли изъ баритовыхъ мылъ и углекислаго барія, то всѣ они разлагались и смывались въ одну колбу небольшимъ количествомъ соляной кислоты, водой и эфиромъ.

Полученныя, такимъ образомъ, въ колбѣ свободныя жирныя кислоты и хлористый барій разбавлялись водою до полного растворенія этого послѣдняго. Растворъ этотъ переливался въ раздѣлительную воронку, а колба тщательно обмывалась водой и эфиромъ и все это тоже сливалось въ воронку.

Затѣмъ, въ воронку наливалось достаточное количество эфира и послѣ встряхиванія она ставилась на сутки для отдѣленія и просвѣтленія эфира, извлекашаго жирныя кислоты.

Когда содержимое воронки достаточно просвѣтлилось, эфирная вытяжка сливалась въ градуированный колоколь и послѣ отстаиванія объемъ ея измѣрялся. Затѣмъ, изъ нея бралось пипеткой 50 к. ц. вытяжки, которая переносилась въ заранѣе взвѣшенную небольшую колбу, выпаривалась и высушивалась до постоянного вѣса при t° доходившей до 100° С.

Зная, такимъ образомъ, сколько (по вѣсу) жирныхъ кислотъ было въ 50 к. ц. вытяжки, легко было опредѣлить количество ея во всей вытяжкѣ, а, слѣдовательно, и навѣскѣ кала.

Изъ молока жиръ извлекался такимъ образомъ:

Отвѣшенная порція молока смѣшивалась во взвѣшенной фарфоровой чашкѣ съ опредѣленнымъ количествомъ высушеннаго химически чистаго хлористаго натра и выпаривалась на водяной банѣ, а затѣмъ высушивалась въ воздушной банѣ, взвѣшивалась вторично, растиралась въ порошокъ и сохранялась въ хорошо-закупоренной банкѣ.

Навѣска такого порошка пересыпалась въ бумажный цилиндръ который и переносился въ Soxhlet'овъ аппаратъ.

Затѣмъ, аппаратъ дѣйствовалъ такимъ образомъ, какъ и съ каловымъ порошкомъ.

Полученный въ большой колбѣ эфирный экстрактъ выпаривался до уменьшенія объема и фильтровался въ небольшую заранее взвѣшенную колбу отъ частицъ хлористаго Na, которыя случайно могли попасть въ экстрактъ.

Затѣмъ, большая колба, содержавшая экстрактъ, а также и фильтр тщательно обмывались эфиромъ сливавшимся въ ту же маленькую колбу.

Послѣ этого эфирный экстрактъ выпаривался и высушивался при t^0 около 100^0 C. до постоянного вѣса.

Жиръ содержащій въ горчицѣ опредѣлялся прямо изъ сухой горчичной муки. Способъ опредѣленія ничѣмъ не отличался отъ опредѣленія жира въ молоко за исключеніемъ, разумѣется, прибавки Cl Na. Зная количество жира въ сухой горчицѣ, легко было вычислить, сколько его содержалось въ приготовленной. Изъ четырехъ опытовъ удалось довести до конца два, которые я и привожу на табл. X и XI.

Для этихъ опытовъ служили студенты младшаго курса А. И. Мошкинъ и К—новъ, оба здоровые люди со здоровымъ кипечникомъ. Оба очень рѣдко употребляли горчицу. Такъ какъ они получали въ продолженіи двухъ періодовъ (съ горчицей и безъ горчицы) почти одинаковыя количества жира, то самое незначительно измѣнявшееся количество его (въ продолженіи двухъ періодовъ) врядъ ли могло вліять на его усвоеніе. Это-же соображеніе касается и количества введенной воды.

Разсматривая результаты опыта 10-го мы видимъ, что въ 1-мъ періодѣ жиру было введено 155,7 грм., а выведено въ видѣ кислотъ 11,1 грм. Слѣдовательно усвоено (принимая эти величины за одноименныя) 144,6 грм. или 92,8%, а при горчицѣ жира было введено 171,3 грм. и

выведено 11,5 грм.; слѣдовательно усвоено 159,8 грм. жира или 93,2⁰/о.

Что касается опыта 11-го, то безъ горчицы жиру было введено 191 грм., выведено каломъ 7,8 грм. усвоено слѣдовательно 183,2 грм. или 95,9⁰/о, а съ горчицей жира введено 202,6 грм. выведено каломъ 12,7 грм. усвоено 189,9 грм. или 93,7⁰/о.

Такимъ образомъ, въ этихъ двухъ опытахъ усвоеніе жира молока при горчицѣ или оставалось такимъ-же, какъ и безъ нея, или-же ухудшалось (на 2,2⁰/о).

Не смотря на то, что опыты мои дали отрицательный результатъ, въ высшей степени желательно, чтобы вкусовые вещества, употребляющіяся въ повседневной жизни, нашли объясненіе въ болѣе многочисленныхъ и точныхъ изслѣдованіяхъ.

Тѣ немногочисленные заключенія, къ которымъ позволено прійти на основаніи приведенныхъ опытовъ, слѣдующія:

1) Горчица не оказываетъ какого либо замѣтнаго вліянія на улучшеніе усвоенія азота изъ смѣшанной пищи въ продолженіи небольшихъ промежутковъ времени и въ небольшихъ дозахъ.

2) Перецъ понижаетъ это усвоеніе.

3) Горчица ухудшаетъ—усвоеніе жира.

4) Какого либо вліянія горчицы и перца на обмѣнъ я не могъ замѣтить.

5) Аппетитъ повышается при горчицѣ, а при перцѣ понижается.

6) Горчица и перецъ очень часто (почти въ половинѣ моихъ случаевъ) вызываетъ расстройство пищеварительнаго канала у непривычныхъ людей.

Приношу глубокую благодарность проф. Лѣснаго института Л. А. Лачинову за полезные совѣты и указанія.

Искренно благодарю А. М. Могилянского, А. М. Левина и П. А. Вальтера, какъ за помощь словомъ и дѣломъ при различнаго рода вопросахъ, возникавшихъ во время работы, такъ и за чисто товарищескія отношенія, которыя всегда поддерживали меня во время работы.

Кромѣ этого П. А. Вальтера за помощь при работѣ съ жирами, такъ какъ со способомъ опредѣленія ихъ онъ работалъ подъ руководствомъ проф. П. А. Лачинова еще до меня.

Было бы большимъ грѣхомъ съ моей стороны, если бы я не выразилъ глубокой признательности проф. Н. А. Засѣцкому, за ту пользу, которую онъ принесъ мнѣ своимъ руководствомъ при первыхъ моихъ шагахъ въ клиникѣ.

Въ заключеніе дай Богъ, что бы въ нашей Академіи было какъ можно больше такихъ безкорыстныхъ тружениковъ, какъ студенты—Сущинскій, Войтяцкій, Бельхертъ, Бѣлявинъ, Мошкинъ и Любомудровъ, которые отдали для моихъ опытовъ много дорогого для нихъ времени.




ТАБЛИЦА I. Опытъ 1. Авторъ.

| Мѣсяцъ и число. | Дни опыта. | Количество мяса. | Азота въ немъ | Бѣл. хлѣба. | Азота въ немъ. | Молока. | Азота въ немъ. | Порция. | Азотъ въ ней. | Мочи. | Азотъ въ ней. | Уд. в. | Кала. | Азота въ немъ. | Введено воды. | Введено плотной пшцы. | Всѣхъ тѣл. |
|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|--------|-------|----------------|---------------|-----------------------|------------|
| 1886 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/VI | 1 | 215 | 8,291 | 251 | 5,008 | 1250 | 6,372 | — | — | 2030 | 15,530 | 1,011 | 53 | 0,697 | 1500 | 466 | 62500 |
| 11 | 2 | 256 | 9,873 | 214 | 4,270 | 750 | 3,717 | — | — | 1440 | 15,978 | 1,014 | 134 | 1,514 | 1500 | 470 | 61700 |
| 12 | 3 | 152 | 7,898 | 228 | 2,993 | 1500 | 6,401 | — | — | 980 | 17,950 | 1,019 | 151 | 1,416 | 1750 | 380 | 61700 |
| 13 | 4 | 184 | 5,859 | 142 | 1,864 | 875 | 4,770 | — | — | 880 | 15,338 | 1,021 | 57 | 0,732 | 1500 | 326 | 61700 |
| Всего . . | | 807 | 31,921 | 835 | 14,135 | 4375 | 21,260 | — | — | 5330 | 64,796 | — | 395 | 4,359 | 6250 | 1642 | — |
| 14 | 5 | 222 | 7,069 | 219 | 2,875 | 1250 | 6,328 | 18 | 0,417 | 1150 | 15,829 | 1,016 | 35 | 0,573 | 1125 | 441 | 61800 |
| 15 | 6 | 180 | 5,732 | 466 | 6,086 | 1250 | 5,827 | 17 | 0,394 | 1330 | 19,110 | 1,016 | 148 | 1,416 | 1000 | 646 | 62000 |
| 16 | 7 | 203 | 10,218 | 338 | 4,414 | 1250 | 6,735 | 17 | 0,394 | 1920 | 17,725 | 2,013 | 95 | 1,023 | 1500 | 541 | 62200 |
| 17 | 8 | 138 | 6,946 | 120 | 1,567 | 1250 | 6,869 | 10 | 0,232 | 1470 | 17,400 | 1,015 | 78 | 1,077 | 1500 | 258 | 61900 |
| Всего . . | | 743 | 29,955 | 1143 | 14,942 | 5000 | 25,759 | 62 | 1,437 | 5870 | 70,064 | — | 356 | 4,089 | 5125 | 1886 | — |

ТАВЛИЦА II. Оп

| Мѣсяцъ и число. | Дни. | Количество мяс. | Азота въ немъ. | Чернаго хлѣба. | Азота въ немъ. | Бѣлаго хлѣба. | Азота въ немъ. | Молока. | Азота въ немъ. | Сухаго бѣльона. |
|-----------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------|
| ⁵ /VIII 86 | 1 | 349 | 11,008 | 368 | 3,407 | 143 | 1,879 | 460 | 1,786 | 5 |
| 6 | 2 | 417 | 13,154 | 215 | 1,990 | 217 | 2,851 | 460 | 2,851 | 5 |
| 7 | 3 | 143 275 | 4,511 11,891 | 315 | 2,876 | 240 | 3,154 | 460 | 2,293 | 5 |
| 8 | 4 | 418 | 18,074 | 338 | 3,142 | 231 | 3,232 | 460 | 1,796 | 5 |
| Всего . . | | 1602 | 58,638 | 1236 | 11,415 | 831 | 11,116 | 1840 | 8,726 | 20 |
| 9 | 5 | 350 | 15,134 | 191 | 1,838 | 215 | 3,452 | 460 | 2,423 | 5 |
| 10 | 6 | 337 | 14,572 | 322 | 3,098 | 409 | 6,566 | 460 | 1,818 | 5 |
| 11 | 7 | 340 | 19,750 | 279 | 2,601 | 185 | 3,381 | 460 | 2,220 | 5 |
| 12 | 8 | 294 | 17,650 | 244 | 2,348 | 178 | 3,359 | 460 | 2,207 | 5 |
| Всего . . | | 1321 | 67,106 | 1036 | 9,885 | 987 | 16,758 | 1840 | 8,668 | 20 |

| Картофель. | Азота въ немъ. | Горчицы. | Азота въ ней. | Моча. | Азота въ ней. | Уд. вѣсъ. | Кала. | Азотъ въ немъ. | Введено воды. | Введено плотной пищи. | Вѣсъ тѣла. |
|------------|----------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-------|----------------|---------------|-----------------------|------------|
| 99 | 0,674 | — | — | 1830 | 25,957 | 1,010 | 208 | 2,875 | 1370 | 1232 | 53890 |
| 203 | 0,688 | — | — | 1570 | 20,633 | 1,019 | 183 | 2,629 | 2630 | 1059 | 53620 |
| 257 | 0,870 | — | — | 1880 | 27,633 | 1,022 | 124 | 2,982 | 2630 | 1052 | 53600 |
| 245 | 0,830 | — | — | 1740 | 23,947 | 1,018 | 225 | 3,075 | 2630 | 1230 | 53100 |
| 904 | 3,062 | — | — | 7020 | 98,170 | — | 740 | 11,561 | 9260 | 4573 | — |
| 178 | 0,602 | 10 | 0,277 | 1850 | 24,944 | 1,022 | — | — | 2630 | 944 | 53700 |
| 192 | 0,650 | 10 | 0,277 | 1680 | 26,641 | 1,020 | 170 | 2,518 | 2630 | 1270 | 53400 |
| 200 | 0,677 | 10 | 0,277 | 1460 | 25,682 | 1,022 | 166 | 2,227 | 2170 | 1014 | 53400 |
| 200 | 0,677 | 10 | 0,277 | 1200 | 22,629 | 1,022 | 408 | 4,699 | 1630 | 926 | 53350 |
| 770 | 2,606 | 40 | 1,108 | 6190 | 109,896 | — | 744 | 9,444 | 9060 | 4154 | — |

ТАВЛИЦА

| Мѣсяцъ и число. | Дни. | Количество мяса. | Азота въ немъ. | Кол. черн. хлѣба. | Азота въ немъ. | Кол. бѣлаго хлѣба. | Азота въ немъ. | Молоко. | Азота въ немъ. | Кол. су- хаго буйона. | Азота въ немъ. |
|--------------------|------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1/IX 86 | 1 | 215 | 6,782 | 171 | 1,583 | 129 | 1,695 | 1000 | 3,883 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 128 | 4,038 | 145 | 1,342 | 83 | 1,091 | 1000 | 5,029 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 56 99 | 1,766 4,281 | 59 | 0,516 | 54 | 0,710 | 1000 | 4,985 | 5 | 0 |
| 4 | 4 | 223 | 9,642 | 204 | 1,963 | 96 | 1,480 | 1000 | 3,904 | 5 | 0 |
| Всего . . | | 721 | 26,509 | 579 | 5,434 | 362 | 4,976 | 4000 | 17,801 | 20 | 1, |
| 5 | 5 | 242 | 10,464 | 171 | 1,645 | 100 | 1,605 | 1000 | 5,268 | 5 | 0, 7 |
| 6 | 6 | 171 | 7,394 | 168 | 1,616 | 47 | 0,755 | 1000 | 3,952 | 5 | 0, 7 |
| 7 | 7 | 203 | 11,792 | 178 | 1,659 | 176 | 3,321 | 1000 | 4,826 | 5 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 157 | 9,425 | 77 | 0,741 | 138 | 2,604 | 1000 | 4,797 | 5 | 0, |
| Всего . . | | 773 | 39,075 | 594 | 5,661 | 461 | 7,985 | 4000 | 18,843 | 20 | 0, |

| Картофеля. | Азота въ немъ. | Горчицы. | Азота въ ней. | Мочи. | Азота въ ней. | Уд. в. | Кала. | Азота въ немъ. | Введено питья. | Введено плотной пищ. | Всѣ тѣла. |
|------------|----------------|----------|---------------|-------|---------------|--------|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------|
| 72 | 0,582 | — | — | 2110 | 20,645 | 1,015 | — | — | 2000 | 687 | 81500 |
| 75 | 0,593 | — | — | 1120 | 13,450 | 1,016 | — | — | 2000 | 531 | 81000 |
| 63 | 0,552 | — | — | 1500 | 17,914 | 1,017 | 213 | 2,984 | 1730 | 431 | 81000 |
| 66 | 0,562 | — | — | 1320 | 15,465 | 1,020 | 135 | 2,644 | 2000 | 689 | 80800 |
| 576 | 2,289 | — | — | 6050 | 67,474 | — | 348 | 5,628 | 7730 | 2338 | — |
| 168 | 0,569 | 8 | 0,221 | 1680 | 20,309 | 1,018 | Н ѡ т ѣ | 2000 | 681 | 80750 | |
| 160 | 0,542 | 8 | 0,221 | 1310 | 17,462 | 1,018 | 205 | 2,284 | 2000 | 546 | 80670 |
| 160 | 0,542 | 8 | 0,221 | 1300 | 19,303 | 1,022 | 453 | 4,274 | 2000 | 717 | 80500 |
| 163 | 0,552 | 8 | 0,221 | 960 | 15,486 | 1,022 | 36 | 0,474 | 2250 | 535 | 80450 |
| 651 | 2,205 | 32 | 0,884 | 5250 | 72,560 | — | 694 | 7,032 | 8250 | 2,479 | — |

| Мѣсяцъ и число. | Дни. | Количество мяса. | Азота въ немъ. | Кол. черн. хлѣба. | Азота въ немъ. | Коллич. бѣл. хлѣба. | Азотъ въ немъ. | Молока. | Азотъ въ немъ. | Бульона. |
|---------------------|------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------|
| ² /XI 86 | 1 | 236 | 12,965 | 217 | 3,539 | 134 | 2,987 | 650 | 3,767 | 50 |
| 3 | 2 | 276 | 15,162 | 100 | 1,631 | 337 | 7,512 | 730 | 4,024 | 50 |
| 4 | 3 | 379 | 20,821 | 173 | 2,369 | 500 | 6,183 | 730 | 3,327 | 50 |
| 5 | 4 | 498 | 28,853 | 327 | 4,477 | 568 | 7,024 | 710 | 3,251 | 50 |
| 6 | 5 | 414 | 23,986 | 176 | 2,398 | 516 | 8,944 | 730 | 3,306 | 50 |
| 7 | 6 | 438 | 21,522 | 225 | 3,066 | 360 | 7,256 | 700 | 3,170 | 50 |
| Всего. . . | | 2241 | 123,309 | 1218 | 17,480 | 2415 | 39,906 | 4250 | 20,845 | 300 |
| 8 | 7 | 310 | 15,232 | 267 | 2,932 | 33 | 0,504 | 700 | 3,170 | 50 |
| 9 | 8 | 325 | 15,969 | 140 | 1,537 | 486 | 7,428 | 680 | 3,233 | 50 |
| 10 | 9 | 440 | 21,247 | 200 | 2,654 | 634 | 10,408 | 710 | 3,376 | 50 |
| 11 | 10 | 395 | 19,074 | 165 | 2,189 | 445 | 7,721 | 700 | 3,229 | 50 |
| 12 | 11 | 533 | 26,281 | 353 | 4,161 | 379 | 6,463 | 740 | 3,518 | 50 |
| 13 | 12 | 563 | 28,298 | 177 | 2,010 | 315 | 5,346 | 680 | 3,210 | 50 |
| Всего. . . | | 2566 | 126,101 | 1302 | 15,483 | 2292 | 28,870 | 4210 | 19,836 | 300 |

| Горюч. | Азота въ ней. | Мочи. | Азота въ ней. | Уд. вѣсъ. | Кала. | Азотъ въ немъ. | Введено воды. | Введ. плот-ной пищи. | Вѣсъ тѣла. |
|--------|---------------|-------|---------------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------------|------------|
| — | — | 1840 | 20,008 | 1,016 | — | — | 2250 | 587 | 58500 |
| — | — | 2760 | 24,089 | 1,013 | — | — | 2000 | 713 | — |
| — | — | 1950 | 26,254 | 1,017 | 260 | 6,488 | 2250 | 1052 | 58400 |
| — | — | 2000 | 27,539 | 1,020 | — | — | 2000 | 1393 | 58575 |
| — | — | 2090 | 33,479 | 1,019 | 130 | 2,850 | 2000 | 1106 | 59000 |
| — | — | 1100 | 28,144 | 1,015 | 257 | 5,079 | 2000 | 1023 | 58850 |
| — | — | 12740 | 159,513 | — | 647 | 18,579 | 12500 | 5874 | — |
| 8 | 0,273 | 2400 | 24,666 | 1,014 | — | — | 2000 | 610 | 58650 |
| 8 | 0,273 | 2360 | 29,391 | 1,016 | 215 | 4,162 | 2250 | 951 | 58500 |
| 10 | 0,341 | 2830 | 33,519 | 1,015 | 220 | 4,442 | 2500 | 274 | 58600 |
| 10 | 0,341 | 2400 | 27,897 | 1,017 | 93 | 2,173 | 2500 | 1005 | 58700 |
| 13 | 0,444 | 2760 | 30,675 | 1,016 | 257 | 6,249 | 2500 | 1265 | 58800 |
| 14 | 0,478 | 3330 | 52,633 | 1,016 | 108 | 2,316 | 2500 | 1055 | 58750 |
| 63 | 2,150 | 16080 | 198,781 | — | 893 | 15,180 | 14250 | 6160 | — |

ТАВЛИЦА VI. Опытъ 6. Н. Е. Вельхертъ.

| Мѣсяцъ и число. | Дни. | Количество мяса. | Азота въ немъ. | Колич. бѣ- лаго хлѣба. | Азота въ немъ. | Молока. | Азота въ немъ. | Перцу. | Азота въ немъ. | Мочи. | Азота въ ней. | Уд. в. | Кала. | Азота въ немъ. | Введено во- ды. | Введено плот- ной пищи. | Вѣсъ тѣла. |
|--------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---------|------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| 14/ 1 87 | 1 | 405 | 20,230 | 630 | 11,978 | 580 | 2,060 | — | — | 1710 | 26,186 | 1,020 | — | — | 1750 | 1035 | 62000 |
| 15 | 2 | 368 | 18,382 | 775 | 14,735 | 400 | 1,420 | — | — | 1360 | 24,922 | 1,025 | 71 | 1,568 | 1750 | 1133 | 62620 |
| 16 | 3 | 225 | 11,238 | 732 | 14,459 | 420 | 1,491 | — | — | 1560 | 22,940 | 1,018 | — | — | 2000 | 957 | 62500 |
| 17 | 4 | 315 | 13,807 | 765 | 11,121 | 420 | 1,864 | — | — | 1210 | 22,447 | 1,025 | 58 | 0,845 | 2250 | 1080 | 62800 |
| 18 | 5 | 245 | 10,739 | 805 | 15,097 | 404 | 1,793 | — | — | 1300 | 20,485 | 1,020 | 295 | 6,533 | 1750 | 1050 | 63100 |
| 19 | 6 | 230 | 10,081 | 465 | 6,987 | 470 | 2,086 | — | — | 1200 | 23,591 | 1,027 | — | — | 2250 | 695 | 62600 |
| Всего . . | 1788 | 84,477 | 4172 | 74,377 | 2694 | 10,714 | — | — | — | 8340 | 140,571 | — | 424 | 8,946 | 11750 | 5950 | — |
| 20 | 7 | 365 | 13,184 | 580 | 9,724 | 600 | 2,034 | 1,0 | 0,014 | 1170 | 23,167 | 1,028 | — | — | 1500 | 945 | 63250 |
| 21 | 8 | 445 | 20,074 | 600 | 11,252 | 520 | 1,762 | 0,7 | 0,010 | 1650 | 22,259 | 1,024 | 316 | 5,247 | 1750 | 1045 | 63125 |
| 22 | 9 | 330 | 14,297 | 800 | 15,003 | 430 | 1,684 | 0,7 | 0,010 | 1070 | 23,528 | 1,030 | — | — | 2000 | 1130 | 62820 |
| 23 | 10 | 330 | 14,297 | 355 | 5,675 | 300 | 1,346 | 0,7 | 0,010 | 1280 | 22,538 | 1,024 | — | — | 2000 | 685 | 63400 |
| 24 | 11 | 350 | 17,263 | 535 | 8,593 | 350 | 1,622 | 0,7 | 0,010 | 1590 | 20,629 | 1,021 | — | — | 1500 | 885 | 63800 |
| 25 | 12 | 375 | 15,846 | 675 | 5,795 | 420 | 1,898 | 0,7 | 0,010 | 1360 | 27,961 | 1,025 | 209 | 3,895 | 1750 | 1050 | 63800 |
| Всего . . | 2195 | 94,961 | 3545 | 56,042 | 2620 | 10,346 | 4,5 | 0,064 | 8120 | 140,082 | — | — | 525 | 9,142 | 10500 | 5740 | — |

ТАВЛИЦА VII. ОПЫТЪ 7. С. П. БѢЛЯНИНЪ.

| Мѣсяцъ и число. | Дни. | Количество мяса. | Азота въ немъ. | Кол. бѣл. хлѣба. | Азота въ немъ. | Молока. | Азота въ немъ. | Перу. | Азота въ немъ. | Мочи. | Азота въ немъ. | Уд. вѣсъ. | Влага. | Азота въ немъ. | Введено воды. | Введ. плот- ной пищи. | Всѣхъ тѣл. |
|--------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----------|--------|-------------------|------------------|--------------------------|------------|
| 14/187 | 1 | 195 | 9,740 | 495 | 9,411 | 520 | 1,848 | — | — | 1530 | 15,620 | 1,016 | — | — | 1750 | 690 | 62420 |
| 25 | 2 | 215 | 10,739 | 750 | 14,259 | 200 | 0,710 | — | — | 920 | 17,900 | 1,028 | — | — | 1750 | 965 | 62820 |
| 16 | 3 | 150 | 7,492 | 665 | 13,114 | 500 | 1,775 | — | — | 880 | 17,917 | 1,030 | 220 | 3,348 | 1500 | 815 | 62500 |
| 17 | 4 | 235 | 10,301 | 630 | 9,158 | 340 | 1,509 | — | — | 900 | 15,678 | 1,027 | — | — | 750 | 865 | 62500 |
| 18 | 5 | 190 | 8,328 | 460 | 8,627 | 300 | 1,332 | — | — | 1000 | 16,645 | 1,030 | — | — | 1500 | 650 | 63000 |
| 19 | 6 | 195 | 8,547 | 400 | 6,011 | 440 | 1,953 | — | — | 1455 | 21,042 | 1,022 | 165 | 2,517 | 500 | 595 | 62700 |
| Всего. | . | 1180 | 55,147 | 3400 | 60,580 | 2300 | 9,125 | — | — | 6685 | 104,802 | — | 385 | 5,865 | 7750 | 4580 | — |
| 20 | 7 | 200 | 7,224 | 515 | 8,871 | 680 | 2,305 | 1,0 | 0,014 | 1120 | 18,521 | 1,026 | — | — | 1500 | 715 | 62000 |
| 21 | 8 | 245 | 8,849 | 595 | 11,159 | 550 | 1,864 | 0,7 | 0,010 | 1560 | 20,706 | 1,020 | — | — | 1500 | 840 | 62400 |
| 22 | 9 | 240 | 9,024 | 575 | 10,160 | 240 | 0,940 | 0,7 | 0,010 | 1060 | 17,124 | 1,025 | 320 | 5,026 | 1500 | 815 | 62300 |
| 23 | 10 | 180 | 7,798 | 375 | 5,995 | 300 | 1,346 | 0,8 | 0,011 | 1300 | 17,468 | 1,020 | — | — | 1250 | 555 | 62300 |
| 24 | 11 | 160 | 6,932 | 435 | 6,734 | 250 | 1,158 | 0,6 | 0,008 | 550 | 11,978 | 1,032 | — | — | 1000 | 595 | 62300 |
| 25 | 12 | 190 | 8,231 | 550 | 10,342 | 530 | 2,395 | 0,7 | 0,010 | 830 | 17,627 | 1,031 | 155 | 2,749 | 750 | 740 | 62450 |
| Всего. | . | 1215 | 48,058 | 3045 | 53,261 | 2550 | 10,008 | 4,5 | 0,063 | 6420 | 103,424 | — | 475 | 7,775 | 7500 | 4260 | — |

ТАБЛИЦА VIII. Опытъ 8. И. И. Войтацкій.

| Мѣсяць и число. | Дни. | Количество мяса. | Азота въ немъ. | Колич. бѣл. хлѣба. | Азота въ немъ. | Молока. | Азота въ немъ. | Перцу. | Азота въ немъ. | Мочи. | Азота въ ней. | Уд. в. | Кала. | Азота въ немъ. | Введено воды. | Введ. плот- ной пищи. | Всѣхъ тѣла. |
|--------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------|------------------|--------|-------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| ²⁸ / ₁₈₇ | 1 | 430 | 19,789 | 243 | 3,358 | 1400 | 6,715 | — | — | 2440 | 36,829 | 1,022 | — | — | 2000 | 673 | 60000 |
| 29 | 2 | 430 | 19,789 | 362 | 5,025 | 1100 | 5,025 | — | — | 1170 | 26,794 | 1,027 | — | — | 1750 | 792 | 59700 |
| 30 | 3 | 509 | 23,424 | 386 | 5,567 | 1150 | 5,516 | — | — | 2350 | 31,072 | 1,020 | 220 | 3,043 | 2250 | 895 | 60000 |
| 31 | 4 | 471 | 21,676 | 311 | 4,297 | 1000 | 4,796 | — | — | 1530 | 30,750 | 1,025 | 335 | 6,716 | 1500 | 782 | 60100 |
| ¹ / _{п.} | 5 | 475 | 21,859 | 410 | 5,821 | 1150 | 5,415 | — | — | 2490 | 33,281 | 1,019 | 65 | 0,834 | 2000 | 885 | 60200 |
| Всего. | | 2315 | 106,537 | 1712 | 24,068 | 5800 | 27,467 | — | — | 9980 | 158,726 | — | 620 | 10,593 | 9500 | 4027 | — |
| 2 | 6 | 507 | 21,325 | 434 | 5,646 | 1190 | 7,434 | 1,000 | 0,014 | 2480 | 32,213 | 1,019 | — | — | 2000 | 941 | 60200 |
| 3 | 7 | 559 | 25,245 | 434 | 5,646 | 1000 | 4,532 | 1,000 | 0,014 | 2100 | 30,376 | 1,027 | 240 | 3,564 | 1500 | 993 | 59900 |
| 4 | 8 | 495 | 24,311 | 427 | 6,231 | 1250 | 6,232 | 1,000 | 0,014 | 1810 | 29,252 | 1,026 | 106 | 1,998 | 1750 | 922 | 59600 |
| 5 | 9 | 557 | 25,342 | 454 | 6,424 | 1110 | 5,944 | 1,000 | 0,014 | 3050 | 40,682 | 1,022 | 355 | 5,882 | 2250 | 1011 | 60200 |
| 6 | 10 | 265 | 10,844 | 415 | 5,892 | 500 | 2,504 | не было | — | 1620 | 20,062 | 1,025 | 84 | 1,024 | 1250 | 680 | 59400 |
| Всего. | | 2383 | 107,067 | 2164 | 29,839 | 5050 | 26,646 | 4,000 | 0,056 | 11060 | 152,585 | — | 785 | 11,768 | 8750 | 3647 | — |

ТАВЛИЦА IX. Опытъ 9. П. К. Бельхертъ.

| Мѣсяцъ и число. | Дни. | Количество маса. | Азота въ немъ. | Полнч. въ- лаго хлѣба. | Азота въ немъ. | Молока. | Азота въ немъ. | Азота въ немъ. | Перу. | Азота въ немъ. | Мочи. | Азота въ немъ. | Уд. в. | Бѣла. | Азота въ немъ. | Введено во- ды. | Введено плот- ной пищи. | Вѣсъ тѣла. |
|--------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| s/п 87 | 1 | 200 | 6,511 | 320 | 5,728 | 910 | 4,685 | — | — | — | 1140 | 21,876 | 1,026 | — | — | 1250 | 520 | 63600 |
| 9 | 2 | 300 | 17,306 | 750 | 13,497 | 750 | 3,861 | — | — | — | 650 | 12,364 | 1,027 | — | — | 750 | 1050 | 63625 |
| 10 | 3 | 210 | 8,624 | 315 | 7,215 | 1270 | 6,112 | — | — | — | 1350 | 24,753 | 1,026 | 140 | 2,615 | 1000 | 525 | 64300 |
| 11 | 4 | 310 | 12,731 | 665 | 15,232 | 520 | 2,502 | — | — | — | 1300 | 24,363 | 1,028 | — | — | 1500 | 975 | 64200 |
| 12 | 5 | 243 | 17,462 | 594 | 10,717 | 970 | 4,669 | — | — | — | 1440 | 25,654 | 1,027 | 108 | 2,212 | 1500 | 837 | 64400 |
| Всего . . | | 1263 | 62,134 | 2644 | 52,319 | 4420 | 21,829 | — | — | — | 5880 | 109,010 | — | 248 | 4,827 | 6000 | 3907 | — |
| 13 | 6 | 220 | 15,809 | 730 | 15,629 | 500 | 3,245 | 0,7 | 0,010 | 1680 | 22,960 | 1,021 | — | — | — | 1500 | 950 | 65000 |
| 14 | 7 | 300 | 21,558 | 650 | 12,344 | 500 | 2,826 | 0,7 | 0,010 | 1150 | 19,645 | 1,029 | — | — | — | 1500 | 950 | 64600 |
| 15 | 8 | 324 | 13,600 | 582 | 10,564 | 1030 | 5,210 | 0,7 | 0,010 | 1360 | 24,454 | 1,029 | — | 386 | 6,059 | 1250 | 906 | 64500 |
| 16 | 9 | 290 | 12,173 | 575 | 9,482 | 1010 | 4,824 | 0,7 | 0,010 | 1570 | 26,075 | 1,027 | — | — | — | 1250 | 855 | 64500 |
| 17 | 10 | 305 | 17,232 | 635 | 13,596 | 580 | 2,462 | 0,7 | 0,010 | 1610 | 26,373 | 1,026 | — | 153 | 2,233 | 1500 | 940 | 64350 |
| Всего . . | | 1439 | 80,372 | 3172 | 61,615 | 3620 | 18,567 | 3,5 | 0,050 | 7370 | 119,507 | — | — | 539 | 8,292 | 7000 | 4601 | — |

ТАБЛИЦА X. Опытъ 10. А. И. Мошкинъ.

| Мѣсяцъ и число. | Дни опыта. | Кол. введ. мол. въ гг. | Количество жира въ немъ. | Кол. жира въ ‰. | Яичнаго бѣлка. | Бѣлаго хлѣба. | Введено воды. | Колич. горчицы. | Жиру въ приг. горч. | Жиръ сухой горч. въ ‰. | Мочи. | Уд. вѣсъ. | Сухаго кала. | Жирный к—тъ въ калѣ. | Жир. к—тъ въ ‰. | Вѣсъ тѣла. |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------|
| 1/ II 87 | 1 | 1400 | 37,589 | 2,6 | 177 | 339 | 1380 | — | — | — | 1570 | 1,016 | — | — | — | 64700 |
| 2 | 2 | 2200 | 59,068 | 2,6 | 195 | 341 | 1150 | — | — | — | 2440 | 1,012 | — | — | — | 64800 |
| 3 | 3 | 2200 | 59,068 | 2,6 | 156 | 440 | 1380 | — | — | — | 2710 | 1,013 | — | — | — | 64850 |
| Всего. | . | 5800 | 155,725 | — | 528 | 1120 | 3910 | — | — | — | 6720 | — | 129 | 11,094 | 8,6 | — |
| 4 | 4 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 196 | 689 | 1380 | 4 | 0,2 | 18 | 2140 | 1,015 | — | — | — | 64850 |
| 5 | 5 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 166 | 442 | 690 | 8 | 0,4 | — | 2000 | 1,018 | — | — | — | 65200 |
| 6 | 6 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 195 | 259 | 1510 | 10 | 0,6 | — | 2740 | 1,012 | — | — | — | 65130 |
| Всего. | . | 6000 | 170,100 | — | 557 | 1390 | 3580 | 22 | 1,2 | — | 6880 | — | 120 | 11,520 | 9,6 | — |

ТАВЛИЦА XI. Опытъ 11. Б—новъ.


| Число и мѣсяцъ. | Дни опыта. | Кол. ввѣд. мол. въ ст. | Количество жира въ немъ. | Кол. жира въ %. | Личнаго объема. | Възвѣс. хлѣба. | Ввѣдено воямъ. | Количество горюч. вѣ. | Жиру въ ней. | Жиры сухой горюч. въ %. | Мочи. | Уд. вѣсъ. | Сухаго калѣ. | Жиры к—тъ въ калѣ. | Жиры к—тъ въ %. | Вѣсъ тѣла. |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1/п. 87 | 1 | 1000 | 26,849 | 2,6 | 94 | 925 | 750 | — | — | — | 1630 | 1,017 | — | — | — | 73000 |
| 2 | 2 | 2000 | 53,699 | 2,6 | 85 | 963 | 500 | — | — | — | 1420 | 1,023 | — | — | — | 72820 |
| 3 | 3 | 2000 | 53,699 | 2,6 | 65 | 1200 | 500 | — | — | — | 1700 | 1,025 | — | — | — | 73875 |
| 4 | 4 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 88 | 835 | 500 | — | — | — | 2530 | 1,018 | — | — | — | 74425 |
| Всего. | | 7000 | 190,947 | — | 332 | 3923 | 2250 | — | — | — | 7280 | — | 81 | 7,776 | 9,6 | — |
| 5 | 5 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 68 | 876 | 500 | 5 | 0,34 | 18 | 2260 | 1,020 | — | — | — | 74000 |
| 6 | 6 | 1100 | 31,185 | 2,8 | 82 | 1035 | 750 | 5 | 0,34 | — | 1680 | 1,024 | — | — | — | 74000 |
| 7 | 7 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 128 | 1066 | 750 | 5 | 0,34 | — | 1400 | 1,026 | — | — | — | 73850 |
| 8 | 8 | 2000 | 56,700 | 2,8 | 102 | 777 | 500 | 5 | 0,34 | — | 2610 | 1,020 | — | — | — | 74000 |
| Всего. | | 7100 | 201,285 | — | 380 | 3754 | 2500 | 20 | 1,36 | — | 7950 | — | 104 | 12,688 | 12,7 | — |

ТАБЛИЦА XII. Результаты опытов надъ усвоеніемъ азота при горючихъ.

| Введено азота. | Выве- дено ка- лоръ. | Усвоено. | Усво- еніе въ % | Выведено азота мо- чей. | Обмѣнъ. | Введе- но жи- вотъ въ к. ц. | Выведе- но мочей въ к. ц. | Въ % плот- ной пищи. | Въ %. | Вѣсъ въ на- чалѣ и концѣ опыта. | Примѣ- чанія. | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------|-------|---------|
| Авторъ. I II | 67,316 | 4,359 | 62,957 | 93,5 | 64,796 | 103 | 10625 | 5330 | 50,2 | 1642 | — | 62500 | Опытъ 1 |
| | 72,073 | 4,089 | 67,984 | 94,3 | 70,064 | 103 | 11125 | 5870 | 52,8 | 1886 | 14,8 болѣе | 61600 | Горюща |
| Н. Р-ковъ. I II | 94,251 | 11,561 | 82,690 | 87,7 | 98,170 | 119 | 11100 | 7020 | 63,2 | 4573 | — | 53890 | 2 |
| | 106,999 | 9,444 | 97,555 | 91,2 | 109,896 | 103 | 10900 | 6190 | 56,8 | 4154 | 9,0 менѣе | 53350 | Горюща |
| М. П-ская. I II | 58,303 | 5,628 | 52,675 | 90,3 | 67,474 | 128 | 11730 | 6050 | 51,6 | 2338 | — | 81500 | 3 |
| | 75,521 | 7,032 | 68,489 | 90,7 | 72,560 | 105 | 12250 | 5250 | 42,8 | 2479 | 5,3 болѣе | 80300 | Горюща |
| В. Ф. Су- щинскій. I II | 180,369 | 16,207 | 164,162 | 90,5 | 140,517 | 85 | 18460 | 12120 | 65,6 | 5167 | — | 55050 | 4 |
| | 181,125 | 18,447 | 162,678 | 89,8 | 155,928 | 96 | 17500 | 11870 | 67,8 | 5537 | 7,2 болѣе | 55100 | Горюща |
| И. И. Вой- тъцкій. I II | 204,636 | 18,579 | 186,057 | 90,9 | 159,513 | 80 | 16750 | 12740 | 71 | 5874 | — | 58500 | 5 |
| | 195,536 | 15,180 | 180,356 | 92,23 | 198,781 | 110 | 20460 | 16080 | 78 | 6160 | 4,9 болѣе | 58750 | Горюща |

ТАВЛИЦА XIII. Результаты опытовъ надъ усвоеніемъ азота при перцѣ.

| Періоды. | Введено азота въ гм. | Выве-дено азота каломъ. | Усвоево азота въ гм. | Усво-еніе въ % | Выведено азота мочей въ гм. | Омѣнъ. | Введе-но жид-кости въ к. п. | Выве-дено мочей въ к. п. | Выве-дено плот-ной пищи. | На сколько % болѣе или менѣе. | Вѣсъ въ на-чальн. и кон-цы. | Примѣ-чанія. |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| I H.K.Bealъ-херть. | 169,568 | 8,946 | 160,622 | 94,7 | 140,571 | 88 | 14444 | 8340 | 57,7 | 5950 | — | Оп. 6. |
| | 161,413 | 9,142 | 152,271 | 94,3 | 140,082 | 92 | 13120 | 8120 | 61,9 | 5740 | 3,5 менѣе. | Перецъ. |
| I C. П. Вр-ливинъ. | 118,987 | 5,865 | 118,987 | 95,3 | 104,802 | 88 | 10050 | 6635 | 66,5 | 4580 | — | 7. |
| | 111,390 | 7,775 | 103,615 | 93 | 103,424 | 100 | 10500 | 6420 | 64 | 4260 | 7 менѣе. | Перецъ. |
| I И. И. Вок-твичъ. | 158,072 | 10,593 | 147,479 | 93,2 | 158,726 | 107 | 15300 | 9980 | 65,2 | 4027 | — | 8. |
| | 163,608 | 11,768 | 151,840 | 92,2 | 152,585 | 100 | 13800 | 11060 | 80,1 | 3647 | 9,4 менѣе. | Перецъ. |
| I H.K.Bealъ-херть. | 136,282 | 4,827 | 131,455 | 96,4 | 109,010 | 82,9 | 10420 | 5880 | 56 | 3907 | — | 9. |
| | 160,554 | 8,292 | 152,262 | 94,8 | 119,507 | 78,5 | 10620 | 7370 | 69 | 4601 | 15,1 болѣе. | Перецъ. |



ПОЛОЖЕНІЯ.

- 1) Отрицаніе больными присутствія глистовъ еще не даетъ права отказываться отъ повторнаго изслѣдованія кала на яйца.
 - 2) Въ высокой степени желательно, чтобы недавно высказанное мнѣніе Вирхова, подтверждающее значеніе опытовъ надъ людьми для клиники, раздѣлялось какъ можно большимъ числомъ изслѣдователей.
 - 3) Снотворныя дозы хлорала въ послѣднихъ стадіяхъ чахотки и разстройствъ сердечной компенсаціи — благодѣтельное и безопасное средство.
 - 4) Введеніе подъ кожу небольшихъ количествъ повторно перегнаннаго эйкалиптоваго масла (предложенное Russell'емъ съ цѣлью дезинфекціи легкихъ) вызываетъ разлитое воспаленіе подкожной клѣтчатки.
 - 5) Отъ употребленія настойки *adonis vernalis* приходится иногда отказываться въ виду рвоты, которую она вызываетъ у нѣкоторыхъ больныхъ.
 - 6) Гулянье госпитальныхъ хроническихъ больныхъ на открытомъ воздухѣ, по назначенію врача, должно войти въ число цѣлебныхъ мѣръ.
-

